理

瀹

駢

文

或疾風 自 治 在氣交之中凡 者有之矣 科湯液內治者也外治 內中乎藏府面 賊 內 暴 之間 飢飽勞役之傷卒暴之變元氣因之 比 則伊古以來未之有也君負濟世之 华 丰 加寒溽暑 亦既不言而成蹊矣顧或 地海陵之東 愛道 呼吸吐納之氣皆天地之還 外發呼肢體治之者亦遂 而錢 山嵐瘴癘之所觸迕 训 浙 据吳君尚 北郷以薄 **贴為多治** 先始專用薄 貼施病 外 疑之疑夫內 志 间 以及情 丽 含其湯 U 规 者 而嗇其 內 則 病 胏

王 子 二二

/ · · ·

蚁 液 風 治者之 巾 變湯 之者 间 也 毫 丽 取 汗 耐 其味 氣 浴 孔皆氣之 液 在 之 710 何以能外 則寒氣得 **平**實 出 而為 內其 采 何 地 薄 疑 取 汗 所以入之 蚁 所由出 其氣 平爾 貼由毫孔以入之內· 而 珋 而入之 取也不知 渝 反氣之 雖然君之學則未嘗 入非 駢文示余 而已氣與 者 觸 而不欲 僅 外 暑 入也草木之菁英煮為 亦取諸氣而已矣今夫 也 口鼻之謂其可 而 絾 非 行 而演之 則熱氣 相 内也人身 亦取 往 中內治無餘 教人 火其氣之 得 見其自 見 八萬 闹 者 當

收 之 知 理 同 知醫 湯液 得 而 有 炙 治 梅齋 要其歸 · 君唇不 一年鞠 之 加 妨 於 利 鉤 有黄華 於 H 外 丽 斷 余 氣 無 吾之沿 共亦 鄙 其害君 非 出 代獲 Ż 於 而委以 有听 以為治 外 治 ph 之 絹 政 序 用 者 然而笑者 <del>7</del>5 而從 因 柳 心 為發 TY 不 中去 訓 涉 液 删 事. 1... 奚不 之 謭 外· 無 智 內 吾之書 矣余 難 ij 貫之 也 旅 可 思 次

4

		<b>玛语</b> 慰女 不序

前 辨者夫其所述天地萬物之理賢聖授受之心學人 致之功乃醫之本也知者自知不知者自不知也信者 也文已詳之矣然其中有不必論者亦有不得不為之 說刊旣成易名駢文屬余序言余觀之網以爲可不序 余性好醫知醫之難未嘗妄為人醫今老矣問懸鎰多 [信不信者自不信也此不必論者也而其為法則於 浦野文、木中 不敢談兹事推以詩遣與而已從弟尚先著外治醫 八諸家外獨閥 門人人共見其無害者也而或以

有可憑者乎夫蠢子數數之有驗者也故人多學其法輕人命即使無功而陰受其功者多矣況施濟有年實 同治三年甲子四月高橋散人書 至數之與皇極經世同出於 謂其書足比邵子 材以下貧無所藉俾習其術以養其生不至重衣食而 一数方今醫學失傳人矣荷中 一原則亦非上智不悟云

理消导文一个序 湫隘卑濕之地而叉時為寒暑所侵內而心腹之患外 余橐筆處州幕兄在鄉自製膏藥以為施治余以時歸 泰之東北郷日俞家垛吾兄與余奉母避亂之所居也 而頭面身體肌膚之疾往往困於力之無如何委而 百有奇凡傭值力作之壯男健婦以及衰老幼稱居 得見兄之所為施治者下河數百里間為庄者 於吾兄之所以施治者而徵之客日施治如何余日 文者其果能活人耶余日能活人客日何以徵之 有問於余日古以醫書為活人之書若君兄之理渝 有异有負有扶掖有提攜或倚或蹲或立或跪或膽或 於其所知來試之而又驗焉以是信日益多傳日益廣 得愈之易也告於其所親來試之而果驗焉所親更告 者多矣此獨不煩飲藥不待切脈竊以爲療之難而竟 **彼夫病之久且深者初請得** 治者半或力能治矣數醫而無驗亦自惜其藥之徒費 山 這近來者日或一二百人或三四百人皆各以時聚 人人情莫不安於藥餌狃於其所常而疑於其所異 不復治聞有施者相率而就日或一二十人或三 一四易已脫然踵門而謝日吾謁所謂高手 一紙膏以去窥其意若不 四

藥不半日 而畢自來醫未有如此之捷簡者月治數干 自述病因侧耳聽之若宜補若宜瀉若宜涼而宜温略 之此膏焉能必應然治得其通而所包者廣衡取其顯 吾兄嘗語佘日醫於外症易內症難實症易虚症難吾 望或呼或叫或呻或吟或泣或啼摧寒於庭待齊之救 日本的 作し | | 人但有所忌於人無所怨於人則膏之能活人可知也 迫甚水火斯時在旁觀者莫不概息以爲繪流民之圖 **賑饑之局不過如是深慮一人胗視之難而力之有** 視顏色指其部位分別散給有重症急症膏外加以 不暇給也而吾兄則自晨起以次呼立於几案前令

慮 僅為耕讀之一助也乎歲在甲子孟夏之月官業謹識 之方在焉風塵擾擾我子若孫其克守此以保家或不 為活人也夫客欣然心悅而退適鳩工旣竣吾兄命余 弁言述書其與客問答者如此醫小道也而修德積善 於海陵寓 齋之小鄂不館 有謂吾取巧者吾豈敢取巧哉吾亦求其心之安而已 而所失者輕可以藏拙可以觀變可以補過可以待賢 王、作馬フ二 是卽吾兄用膏施治之本意也夫亦卽此書之所以

略言 歸之理質之老友咸日是誠一門但惜爲儷體又 莫如膏藥氽鄉居八載行之旣驗不敢自秘爰取所 亦不可通思所以濟其窮無悖於古有利於今者則 宗之易日窮則變變則通顧湯液要無可變而鍼灸 外治法鍼灸最古白漢張仲景易鍼灸爲湯液百代 凡病多從外入故醫有外治法經文內取外取並 集衆方為駢文以聯綴之非為發明內外治殊塗 史非所以通俗也尙宜撮其大意為淺語以提其 人開卷瞭然余然其言乃補增略言於首

括吐臍之 外汗敷類 未嘗教 血脈此 内經用柱心漬酒以熨寒**炖用白酒** 足信矣矧 **妄變古法者非也** 經救卒中暴絕吹耳而通 外治之全矣尤捷於內服彼種痘者所下三法已尤捷於內服彼種痘者敷臍亦是下用坐坐取氣水自下是數層及羅下用坐坐藥也即下法 《祖於此今以湯頭還爲膏藥於義為反其本以爲 用膏藥之始仲景桂枝湯治風寒調和營衛 是下用坐坐取氣工是用嚏嚏即吐也 (専用内治 也 水即鼻在 七竅氣之 和桂以塗風中 也如水 中用 相威其神 納鼻而傳 三腫塡

精思亦不可不細繹今無名師是 外治必如內治者先求其本本者何明陰陽識臟 治在內也外治之 可不讀 也靈素而下如傷寒論金匱以及諸 異者法耳醫理藥性無言 發洩造化五行之與蘊下亦扶危救急層見叠 有博通之 不窮且治在外則無禁制無室碍無索掣無沾滯 即喻嘉言柯強伯王晉三諸 个略言 )醫當於此見其才 而有用操縱變化自我雖治在 一而法則神奇變幻 師也通 大家所著均不 所闡發俱有 外無

膏與藥分為二臨症活變在此有但用膏而不必藥 膏藥白藥以相反相濟爲用者有膏即藥藥即膏 矣諺云醫得頭疼眼叉瞎良工要不如是也 知其一 流徒恃一 相佐相益為用者古人於熬者日膏撮者日 者有竟用藥而不必膏者有膏與藥兼用者有膏自 所見設遇疑難之症古無傳方其不坐窘者幾何或 內治並行而能補內治之不及者此也若不考其源 未知其二 一相傳有効之方自矜捷徑秘訣 此 雖無失而彼已陰受其損者 而中 無

膏藥則或糝膏內或敷膏外或先膏而用洗擦或後 膏又有表裏寒熱虛質分用之膏互用之膏兼用之 膏綱也樂目也膏判上中下三焦五臟六腑表裏寒 腑有通有滴叉有通治三焦通治五臟通治六腑之 膏有專主 職陳殷置輔敷布精密水洩不漏可為用膏用藥之 陰陽消長可知內治之理思問觀一部周禮六官分 膏而用熏熨膏以帥藥藥以助膏景嵩厓謂觀大易 有上焦心肺之膏有中焦腳胃之膏有下焦肝腎之 熱虛實以提其網藥随膏而條分樓析以為之目膏 嚴之膏臟有清有混有專主一腑之膏

理論 法讀書 育方取法不外於湯光凡湯光之有效者皆可熬育 理中建 等為常用之方也或謂川湯光熬膏何不 **吾惟不敢為內服故用膏耳自來相戒帜** 藥也所見不眞桂枝下羽承氣入胃並可以斃 害無窮愚者自是而不知其非旁觀皆竊笑之 味麻黄 僅香蘇神尤黃連解毒木香導帶竹溉化爽以 知之而不肯,自言未将不愧且悔也然焉能 期マー 人當識此意情 耶 **味黄連** 調胃平胃六君六味養心歸脾 一味白朮一味熟地用不得當 四數藥宜作品 **錠** 第 方 **企業省研** 補 内服不 中盆 明者 即 氣 及

里解併と一名言 解表之方而春可治温夏可治熱秋可治温 治百病之非為證不知此亦偏見耳藥不止 症 為下藥藥適加病倘遇不肯服藥之人 法門吾之用膏即本於此使必內服而後, 用常山飲炒嗅治瘧變湯劑為外治質別後人無限 且良工亦不廢外治昔葉天士用平胃散炒熨治 出之乎或又云夏工可不忠此亦思夏工古今有 而其情其理萬萬不忍坐亂者又將何 症彙而集之其統治也固宜如沖和湯為 統治百病人皆談之且舉名賢論紫 不能服藥之 4 可無論妄 走 以處之 金錠統

海之藥成備越鞠治氣合痰血食温熱變之而為薛 以一方統七情飢饱勞役等因胡念齋深服之陳 麻黄白朮散治風火濕熱醬而為病而表裏寒熱補 **閻復賞之他如三科湯三一承氣三** 中滿分消北合二陳平胃瀉心四苓六君而為 八味逍遙加之而為養生 丹溪治痛風有上中下寒濕食血痰統治方東垣 亦 毛經絡上而頭項下而腰脚婦人調經無不可 三症五積散為內傷外威之方而內而臟 有神也通聖散為雙解表裏之方而兼 TO ME THE **一八帶解毒 高鼓峰治** 一
腎
氣
六 治 外 風

外治藥中多奇方學識未到斷不能悟或少見多怪 盡是亦所謂握其要也握要之道 要也 皆即統也病可統而藥不可統乎知其要者 **陰有寒濕陽有燥熟而已觀病機上** 線貫串百錢可削干錢萬錢亦無不可是所謂握其 之擴之雖治百病何難要之人病不外氣滯血疑及 則治自通矣然通須虛心讀書 氣之類古方如此者不勝枚舉膏樂本其意而更推 終製膏藥者亦在乎能握其要而已滿屋散錢以 副牙牌不過單雙配合而千變萬化用無窮 一九條文曰皆屬 通字該之理通 一言而

·肯中門藥明必得近經走絡開竅透骨拔病外出之 其法不用其方非獨時異勢殊症多遷變方未可 新方用之張元素云古方今病不相能許學士云 之孫之熨之原方可用則用不可用則選他方或製 反訾古人為非則大不可吾謂醫之所患在 泥亦恐後人不識前人妄加貴議而教人以圓而 既有其法方可不執如一 之之法也所謂語於師古者此也 可以繁洗之熏之有盒法擦法熨法我即可以藥會 5加·貴葱莊蒜白芥子花椒以及槐柳桑桃蔥 一症中古有洗法熏法我

里常消え 則斷不可用 骨雞光鱉甲煎 也須知外治者氣 藥味必得 則化。 如竟換用が · 山川門 甘 送 本 血內之物則與人有盆如羊肉湯猪腎 賊殲魁此 如 無碍 用牛 氣味俱厚者力能得力雖蒼 鰤魚青之 換銀 又 車花 炒 胞衣代之其力尤 車 血流 用蒸用皆不如 類 子之類。 通印是補不 所 豆草烏南星木鼈 円 以 倣 加若 樂補 用勉 補 氷

膏藥熱者易效涼者次之熱性急而涼性 也即 易效補者次之攻力猛 以今醫所處 也此又在臨症之斟酌而變通也寒多 可以養患也 凉其氣即爽極虛之症受之以補其神即安 也况得稱青平只在對症耳若夫熱症亦可者其空處有以只在對症耳若夫熱症亦可 從治之法也虛症亦可以用攻者有病當先 田一手 則得熱則行也 且以氣 和平 輕淡之劑 而補力寬也然大熱之症受 相威虛人亦能 熱重 一則以熱引熱使熱外 則見 勝無虛虛 緩也攻者 者 愈

發於陰而誤治者與病發於陽而誤治者皆有法 仲景傷寒論有火熏令其汗冷水噀之赤豆納鼻猪 非法之咎也後賢於痞氣結胸叉有禽法殼法是病 膽汁蜜煎導法皆外治也汗下之法具矣用之失宜 正以逐邪之義也若治兩症則寒熱消補雖同用而 上不犯下下不犯上中不犯上下更無顧忌 **督藥者之** 至周且祥矣而特以才高識妙不必專主外治 一於無陽者宜蒸臟結者宜炙於無法之中更 藥何獨不然精要有貼温膏敷涼樂之說足為 一訣推之亦可貼補膏敷消藥也此即扶

国浦 炡 熱邪 模 倸 或 有膽 胸法 方不若 推 辨 血 渴心白虎等法豈能 謂 旨在 计青黛 石膏和雪 能省特 裹有黃連 症 斷 水 水敷 水洗 能 陰 摩 用 足太陽傷陽 胸法 逓 辨之 胸法老 水 外治 掃 外 有 於 皮 犀角 分 硝 明 此 譋 地 傷 夹 衂 始 黄熬 如 而 症 陰上 觀 搦 傷 寒外 鞠 凯 有 得 胸 從

占膏除太乙觀音霏雲外治四時傷寒有兩萬靈膏 者頭截較昔人先用葛根斷陽明蒼水安大 **膏湧泉膏可見內症用膏古原有是法特其藥**魔 者比類求之然則以外治法治温症即可從外治傷 治脾胃有金絲萬應膏治勞損有五養膏叉有暖 寒之法推之已或叉謂温症傳變至速非膏藥所及 在用者之心靈手敏耳惟是法由我造不能為撿方 藥傷寒皆有之即傷寒所未有不難以傷寒之所有 治病者道也破習是而化拘率是所望於 不知湯光不能一日數服而膏與藥可一 聰 日數易只 陰尤看可 明理達

晉三論本事四神光方云剛去背謬之藥複川 藥方為世指南也高手指南則臨症亦有藥方為世指南心藥天上有臨症指南外 **危急始用膏藥安能有濟此占膏之所以** 耳食者遂概以為膏藥不足恃至於服藥無效事 相使之品自奏奇功此與古之功臣安得今更有晉 并治及外症與湯頭之純 二其人者為古膏 則項百會後項五穴也兩傍勝承光通 作市 起諸陽之熱逆也頭中行脈 一穴如經治熱病五 開 生而而并創製 者不同醫家多訾之 不行也 種膏 遵行矣

且有中 陽經外感初起以膏貼雨太陽頭痛風池風門死路 **嗣骨即肩委中** 即居 動成 臟俞傍五十者瀉五臟之熱共五 其勢也症雖重得此分殺其勢其病亦滅膏藥治太 熱氣衝三里巨虛 穴也天杆曆命的穴鉄盆背俞門点 樞十穴也 於心更用藥敷 七心皆取 髓穴 分殺其勢即從刺法推 天庭熏頭面腿灣擦前胸後 下廉八者鴻胃中之熱雲門 削 麎 八者瀉四肢之熟五 十九刺所 八者海

王派馬ろ 湯液內治猶在闇室也膏藥外治猶在大庭廣眾之 治可蒙而外治不可蒙然易於補過在此不蹈重咎 可以代內託治外症亦不必服藥者以此飲為以 亦在此彼貧無所恃不得已欲藉醫以謀生者讀書 地也誾室人所不見大庭廣衆之地人皆見之故內 與臍眼對足心與丹田應外症除貼患處外用 旣不多問悉又未深以 心口以護其心或用開胃膏使進飲食以助其力 中貼臍眼下貼丹田或兼貼心 四四

**膏藥多處於窮苦之人 氽所製膏方惟淸陽膏散陰膏金仙膏變膏催生膏 第民陰行其德不以財論尤爲造**福 其心可耳惟膏粱脩合無人見不可鬻良雜苦自失 專二則平時不服藥故也富貴之家一 退而膏藥能用之有驗則亦易於傳播醫者但當盡 其眞更不可乘人之急挾貨居奇以蹈惡習若能於 能遽以膏藥為是然當百藥不效之時諸醫束手告 列座親朋省問各舉所知且參芸視為常食之品何 保身且以保嗣有以 一膏起家者資亦不必多也 則無力延醫信任不得 有微恙名賢

腹 待膏藥特此時氣不行陰非借膏藥之力斷不得睡 心中煩亂火升於上見愈不下貼此膏後無不自覺 轉身亦有力矣造化自然之道仍以自然還之原不 以備生而病者用也往往產婦二三日後目不得瞑 最騐己刋附駢文之後產固非病生亦不必催有膏 中温媛也此即介以潛腸之法也睡者六字眞言之 **义非以膏藥安產婦之心而令其睡以** 能睡則陰氣自復交骨亦開矣且睡則見得休息 中温媛即時閉目安睡睡醒即生夫用純陰之膏 **给温媛葢陽氣外洩得陰膏而陽迴於內故腹** H 里、開併と「各当 東丹温症解弱膏內傷退熱膏熱結膏冷積膏火鬱 藥可以自造不必古人曾有此方也其餘尚有靈靠 膏健脾膏清胃膏温胃膏和胃膏清肺膏温肺膏 **膏泰山石刻膏七寶遇仙膏濕砂膏延齡膏清補膏** 也醫理精微在人靜悟哪率此方質諸當世以見膏 見有難產者或以硝黃下之或以草麻等拔之卒無 **膏陽症湯熱膏陰症逐寒膏中寒囘陽膏陰症救急** 温辅膏傷風数散膏傷寒發散膏三時感冒雙解膏 效而臨死時自揭其衣者有之此陽氣外龍之故 此中有醫意焉所以應試俱驗 病可療仿此 曾

膏三 膏識腸膏通治風熱膏通治濕熱膏通治寒濕膏渗 膏痢疾膏婦人訓經膏固經膏安胎膏備庭膏小兒 心化痰膏養心安神膏清肝膏養肝膏平肝膏温 清熱膏消食膏定驚膏補脾膏化痰膏不疳膏殺蟲 消脹膏减渴膏飲汗膏開膈膏蠲痺膏化痞膏瘧疾 濕膏辟濕膏開贊胥理營膏止衂膏行叛膏控涎膏 幾未能自信姊存其名如文之有題能者可自造焉 **余所著駢文因文以立法自比於酒經茶經書譜** あっといい 柴胡膏清腎膏温腎膏保柏膏種玉膏潤腸 一種皆本古方增城為之惟皆新製試用未

理! 取其精 鼻表 以 此 所 仿枳萬 遏 實靈香則 熟 耕 誠 方 後 文 搐 熨等附用 所 不與 熏 法育察萬 先短 同刻 也余 列辨症 方 以為青葱 選 代主紫等 捺 而 不徒 道 熨 或 擬 眉 承附蘇育 烙 嫌 於文中摘 次論 汪. 糝 症 氣以熏為 敷 諸田腿主 症皆各有 治 下螺導附之 醫 藥解諸以 藥 大 集化石發麻佐用 其 之數計黃之 樂 稍 體是法樂散一官 郁 方 刘比 盚 重外 更 也以在默門除 11 眼外通 博 代之 此五入川如治 膏 采 部 別無 他 解 為答裏芎傷者 爲 亦 立書 書 并 例大則散寒另 過 主 法 故 黄用搐在為 附 益 深以所句

į 能 得效 法 知 天 背數年 逮 親驗萬 能 必有 立應 重 可 屼 哀老 同也 來閱歷之言 服 得效 法與 其故 自序 始 **稺弱**尤非此 藥 眾 知膏藥治病 耳 徐十諸靈要後 余 初亦未 鄮 胎并 赤 效 抉柯 無殊 者 夘 死 11 今 敢 巾 調 說看 破 藥 外治 症 有跳 迺 可 矣看 病 用之 聽

他 無 推廣此其大略也至於道之不同固有不必强相謀 欺世其中書不盡言言不盡意在人引伸觸類自 吾薄內治則吾豈敢病科 內外治皆足防世急而以外治佐內治能兩精者乃 **者吾惟憫生命之多枉自抒愚者之** 命が年と 法以收其效素特將平日 為欲學外治者之一助自問不同 失吾爲醫家計似 一卷嗣 沿形體之病老人 出 蘭臺軟範云有人專用丹溪摩腰敢馬科兼用膏藥未嘗非計病家 讀書臨症者 門外揣摩空言 得 一級而出 而已總之 法若謂

法令亦重之叉滙泰云金沸草散原治傷寒痰嗽 法陳脩園於鶴滕風症云有雷火鍼為中及陳芥 末葱涕薑汁調塗外治二法不可不知此見外治之 **次若腹中病亦可摩此見外治之法古未嘗不行 熏舌脹遂愈此 、倭硫磺** 王晉三云喉風急症舍吹鼻通肺之 如胡桃大烘熱摩腰俟 載篇 入中 見內治方可移為 内以倘好事者重判時漏之方與友朋寄示良 腰熱扎好 外治也皆 外治 別無他 油 或

續增略言 古醫書均有治驗余學外治十餘年日施濟數百 專以膏爲主而慘藥敷藥輔之其治愈不可勝計膏 理自鬆即解肌也涕淚痰遊並出胸中悶惡亦寬即 並行不悖令載於後並詳取意與其用法以待推廣 仍屬外治有益無損可以嘗試可以更換於膏藥亦 以此塞其請用之頗有竒驗雖從竅入而以氣相感 **捷佉不獨通關急救用聞藥也連嚏敷十次則腠** )外別有數法與服藥相通者病者必欲服藥每 一焦之病以樂研細末暗鼻取嚏發散爲第 HORY OF TAILURE

西浦馬之 利州 連各一 賢治傷寒中風傷風時疫温症由肺逆傳喉風赤眼 吐法也蓋 芎白芷薄荷細辛憂荆子躑躅花雄黄硼砂青黛黄 風單用鷞不食草 傷風熱頭疾赤眼喉腫牙痛者用羗活防風荆芥川 多以皂角細辛爲主黎蘆躑躅花爲引隨症加藥 牙疼等症皆有喑薬亦使病在上者從上出也其方 水者但取其氣上行不令藥入喉也毛養生治重傷 錢五分蟬蛻五分皂角一 錢生石膏風化硝各||錢鵝不食草三錢僵 · 嚏實兼汗吐二法不必服葱豉湯 味研临涕淚出即清爽可與此 兩研末含水吹鼻含 也前

担害件に下 用 散用如治冬月正傷寒頭痛者以麻黄易藿香亦可 散蒼朮五錢細辛三錢大黃貫仲薑厚樸法半夏 **喑鼻嚏出膿血痰涎為度時感及濕温等症用辟瘟** 中風吐痰用皂角黎蘆明礬暗鼻或以人参藜蘆並 **暗鼻此方可代藿香正氣散用亦可合不换金正氣** 又斟酌活變之怯也大頭瘟及時毒爆腫喉痛用延 相證王好古解利傷寒用藿香藜蘆躑躅花研 |香羗活柴胡前胡生甘草防風白芷 錢五分川芎一錢黎蘆五分躑躅花二分五 **取其相反爲用一** 自然のするでは 取其攻補兼施也虛人宜之

**对消息之一角**均 用較服升藥土旗尤速外症腸出不收及產婦子宮 嚏而汗自出馮亦止是發散之中即兼升提一 末喑鼻曾有發熱頭疼惡寒無汗并肚鴻者用此取 也如不用喑可用濕紙包藥塞鼻亦同古方治 肺盆而水自下超胸中之水或吐或邁而出小便不 通探吐提氣而水自下則知嚏法能上升亦能下降 之也又夏月治濕病者以瓜帶赤小豆含水喑鼻清 不收取嚏即收亦是此意凡欲升者均可以嚏法升 木香丁香雄黄桔梗各一 枳殼香附薄荷陳皮神麵炒石菖蒲草蔻仁香薷廣 西草 一錢硃砂五分皂角 | 一兩研 法两

病眼生故穴與之同 卽 頭 到 煎 咴 湯 痛 但 騈 能 空 故空鼻亦能得 用 湧三於對 鼻 孰 赤玺 用泉里思 ép 놴 為 心煎炸 思可去 嗅 满 剱 蹇 湯置壺 百族 勇不 亦 用 眉 房 至 無吸不受 峢 一眉告青枝心治育 不 欬 焦 法 透 可 中 虚 此 得嚏 之 覆 膈 肺梅屬 氣 吸 ,或泰以吸, 冷嗅附 代 病 **內服** 氣法 佝 有 喉 鼻小咽黑屬 之 自寬叉治 塗 脾 婦 法 寒 丰穴頂 有 其 如 氣能 故此有庭百此為 也 嗅肉 用 治 血 魚 凶病穴會服與 桂 物 虚達 眼

背放皮諸三疐褲喉 手 紙能針喉疾屬 項 塗! 两有最病陰疾 等下刺症亦心常項 旋 面擦薄之所治 臂 不大掌積之用有鼻從爲 夾背易所滙此個黃愈指上中即三扎動此太」 鲇法透生之又中疸用二置風散棱指分入陽 之及或也處曲指有蒜指碗用。握 法男腦經 Ψij 法心連儿乃池長塗泥手以革 堂 下病治穴即臂敷背熱麻治掌大女截門 啊 所 處 手即是大之微水仁積亦指右動天 院宜經臂曲內過窩冲半聚屬外扎有柱 爲 穴治要彎澤方夜處入粒及心側此塗所 布 贴此穴爲穴又起爲碗搗老心 方法。 其也手在內一經中爛人主韭婦方風 焦 臂關小渠靜塗虛汗葉鼻 及 之 膊穴泡穴坐掌寒故許伽 冶 見 病前 膻。樗在挑治片上便握名非 文 病 多後 上腕破牙時攤私藥少此 三上愈痛亦掌握能商不 中 握 從心爲即 俞相上心寸積并从开於藥發穴救 指 摠 應焦日是三抬而 數又打治療指中

日になるがけれて、古具は目をは会社 縛臍 寒用恋量豉鹽炒熱布包掩臍 包置臍上以碗覆之腹筋即止治痢用平胃散炒於 舉其端以醒眼 何 以中且 一縛脐上爲第 米飯盖之以口中有酒氣爲度又有用乾薑白 方皆可 再發再捆 一獎可逐 一冷則易之治瘧用心山飲炒熱縛臍上 照用古人治黃疸用百部根放臍上 日中辣去之則知由臍而入無異於人 目〇 數次必愈是也此法無論 日變換也叉治傷寒食積寒熱不 **范法炒香川氣易透** 中焦之 一治霍亂用炒鹽 切粗 如 y 何病無論 上共發 布

盛炭火偏之汗出而愈亦是此意畏炭火者 制宜矣至背後脾俞胃命有須兼治者又有 東扎好放電上 之或空中運之治陰症者用炮畫附子肉桂 後以桑枝燃 **萸末綿裏放臍內上** 冷水偏之治寒熱変混者冷熱互熨之此在臨 3 倍法皆所以偏藥氣八肚也治風痛者敦藥 寒 一个人人是或手摩之皆可治大熱症 熱之藥爲餅置臍上 火倡之治乳癰者搗葱鋪乳上 H 一熨斗熨之或鐵烙烙之葱爛再易 Ħ 一盖生薑片以葱切片碗粗 人
以
斗
ム 麝香吳 熏臍 用

運皮 臍 症 包坐於身下爲第 並可縛 陰頻 從 盛 陰凡有病宜從二 酌 淨砂炒過 寒症用 藥夾囊下又是 用 包墊毡片坐法撈多屬肝腎之損故治在 小便出小便不通亦然水鴈不止艾一 **膝盖 微火烘脚鴻自止是也** 〇下焦之病以藥或研或炒或隨症 **州兴英姓床子炒型者用糯米炒熨货** 加川 椒 小面末拌勾隔褲坐之 便治者仿此治疝者用竈心 **捷**法如水腫搗**恋**一 法 婦 人能助 人癆症有燒熱 類牌 屬前陰一 (文中) 用 机 数 腹 觔坐身下 並 而製 斤坐身 用 þJ 隨 布

理倫財文人續增略言 有煎樂水傾補中坐熏者即用峻樂如稍黃遂 用 口 不至大傷元氣又治人痢人虛或血崩脫 此又是 病宜釜底抽薪者更以坐爲優矣又治鼓腫 能達到或恐傷胃氣者或冶下須無犯上中者或上 用 古治婦人本有坐藥但以導爲坐不如坐身下 升樂用補中益氣煎湯坐熏産婦陰脫用四物煎 (產婦便秘用導法最妥 大劑或有宜導者不妨兼用蔣示吉云治老 龍骨入麻油熏洗皆與坐法一 **法則知下部之病無不可坐若內服藥不** 例或馮或補 五 肛者不敢 ) 所服

用其獸法人盖故即 下湧治與下三意骨骨喉治腿紙陽一 卡症陽停納如寸 ■如穴腎肾要穴此知喉有虛皆氣欲爲三 消者刺者足歸用陰 膝俟歸用委有 世下此通醫盖知何灰中蔽陰者桂 下者處麵穴膝所變引肝丹病才 三如愚四法縛滙敷火腎田 寫腎亦即病寸能按兩胎法核臍歸娶 噤之有指有外推亦冷莎方陰下元穴關 白旁之是水者見症最用 屬則引調亦文及妙破炙 陽用下敷有中三 膝法層 眼貼法同腿明法法膝之傷陰盖治 陰 可但盖の寒 瘧 腿 一又有皆 變近寸 下亦窮解時治熏敷穴即毎爲治 其之魚腿滕〇 脚 腿 人禽癆盖膝中此海 臍

理 應或三焦並治熱之類乃子母 單熱椒敷風 其法俱不出於此不獨 焦之症上 縮胎症踏足 陽飲保者心 此 及凡古方之 症分明 二法雖分上中下 有治胎侵 或等 一治中焦之症 有未備 心者樂者烘假法古敷亦之陽 者可於 治療泉膏諸法で 得到即 可代內服並 三焦而 视 症 用膝大用 相通熱 治或治 凡 上 古甚 减 無不 泥泥片 之並青 一焦之 下焦 塗爲者 可助膏藥 足導久不 中而 無拘牽 미 定症 也可推 之法 誠 吾用 云勝 抬 備 尉 用婦川藥 下 相

単一の一個では、一個である。 諸方推廣外感風熱初起頭痛者以一解及敗毒外感風熱初起頭痛者以一 **城加 終膏貼欲下者貼膏後用硝黃散的** 更便 並 風 雞子淸調敷胸腹雖結胸亦能推之使 ) 余施胗專以膏藥為主因貧 貼金仙膏如人裏後欲清者加硝石散 門風 焦鬱積用金 也 即散無傳經之變內熱者兼貼膻 凡治上 輕數發後可截者 氣痛腹痛立效達疾先用金仙膏貼 焦風熱及內外熱症並用清陽膏本 仙膏爲多病屬帶積 用散陰膏加 積氣諸方 膏貼太陽 加減氣素 中夾食 並

Ŧ 重症逐漸 無後患痢疾無論老少皆用金仙膏。 張必愈三陰瘧雖數年者亦效品口十日免復發並 加樂再以生薑兩塊搗敷兩膝盖輕者即愈重者不必 骨中間先一 用散陰膏爲 治愈不止萬 上輕症半日腹響洩氣小促通利胸中廓然即愈 輕減。 時用生薑擦後再貼並貼 不過 巴胡霜椒 少許 數日亦愈此二 用 育 人有加味盖膏藥與湯劑果二種錢特為打 子貼項後第三 一症夏秋最多。 i Q 棋 第 施口 下焦寒濕 四骨 貼 兩

用糝末專抬尤應外症則始終只用雲台 明喻嘉言先生寓意草載與門人定議病式云某年 黑白枯潤若何聲之清獨長短若何人之 某月某地某人年紀若干形之肥瘦長短若何色之 敷薬糁薬亦不用內託服薬并不用刀針升降等薬 滋陰健脾扶陽數膏皆不可少亦有試皆效重症酌 及 也擬將全方另為刊刻故茲不多贅 脾虛他凋者貼臍並對臍皆效風寒濕痺筋骨疼痛 可用此舉其至驗者餘膏如行水熱通利養心清肺 跌打閃挫 **肌** 即愈 二膏治症甚多內外症皆 形志苦樂 膏加以

**性倫駢文||^積增略言** 中 吐 **丙外或不內外依經斷為何病其摽本先後何在** 脉中何脉獨見何脉並見其症或內傷或外患或兼 效某藥不效時下晝夜號重寒熱熟多飲食喜惡多 和食其效驗定於何時一 則醫豈易稱哉安爲下藥不效歸於病嘉言所 何病始何日初服何薬次服再服何藥某藥稍 外治知為高明所笑求免於過而已閱者鑒之 何劑五氣中何氣五味中何味以何湯名爲加減 下和寒温補源何施其藥宜用七方中何方十 一便滑濇有無脉之三部九候何候獨異 詳明務令鐵毫不爽據 十一四

錢唐諸生汪畫山名祝堯余從妹婿也爲 與內治說不同其中如觀水影之浮沉等句外治之 臍坐身蔽膝裹足諸法臨症之變化也是皆道之所 **胗也天取其氣等句外治之製藥也毋犯所忌等句** 發揮用議論體直陳已見以為斷雖未必悉當而要 法余文前半徵引用考据體詳列古方以爲案後半 外治之臨症施療也而 而殁前與余避兵海陵助余散給膏藥因論及外治 之道余日亦不外天地萬物之理與前聖相傳之心 八以誠深於內外醫道著有外科易知二十卷未刊 切點眼枕耳窒鼻抹胸縛

理淪騈丈人 病食以養人殊不言補所謂補者辛補肝鹽補心 技之則病自出無深入內陷之患病所經由之處截 著也維膏與藥 遂能伏病余日蟻穴潰堤知塞其穴堤自不潰其 一則邪自斷無安行傳變之虞叉問膏藥方寸耳 在諸公且思之 大原也苟能推之外治其亦無窮盡也乎又問膏 功用如何余日 也又問膏藥能補否余日能補但經文藥以 ~ 續增略言 **脾苦補肺不以** 段抉內外治殊途同歸之旨 是抜 生爲補而以剋爲補其義 是截凡病所結聚之處

理会派と 濄 寒利若温則骨髓之病上做皮毛助邪爲毒也四審 急如陰分陽邪陽分陰邪也又過用寒涼陽變爲陰 陰陽謂治主當緩如陽分陽邪陰分陰邪也治客當 與鮮明昏點板活也糖不盡紅也疽不盡白也以紅 錄其要者亦可識 所學之精矣 者發疔不盐硬也於怕酸三分表裏謂受之外者法 至畵山所著根抵先賢自挦已見足爲外科指 宜温託若與則皮毛之邪引入骨髓受之內者法宜 謂如內科之求其本也二望形色謂高聳平揭軟 用熱燥陰髮為陽是傷而又傷也五看部分經絡 一夏百名主 祭所因內因外因

王作其三八多比田三 淺卽託之而必使出內託之效亦速也凡已成不起 先宜分消否則氣血熱而瘡口卽合尙防流注也 疽則本王全生法而其最重者一 **疎通行榮衛三法潰瘍則本丹溪補託元氣之法陰** 無膿卽宜補託寒者用温中法其餘辨腫辨膿以 內達外內簽多不治也其治法腫瘍則本潔古託裏 形症方藥菜集萃書無不詳細該負情無力刋傳 在內託謂邪將內陷者託之而不使人內託之功匪 多虛損候又毒生虛處俱險又發於節而相應者 上焦壅塞實候中焦皆涩滯候亦乘虛而作下焦 在分消調熱重者

理論以文 爲子弟將來學醫行道之式也众以爲膏藥與湯藥 百病一 之法及膏外如何加藥法與湯頭如何外用法盖擬 得不與揚頭異者盖湯三專治分六經用藥一 殊途同歸之理文中已詳之矣至於膏之用藥有不 方糊刻傳播矣近復索余新增方並詢余如何製膏 骨有百餘味 用氽膏方十三種脩合擠人且與其內親胡槎仙將 **余親友中趙璘書表弟最信** 方日可 方月纔一 ~ 續增略 吉 易故其數精而少膏三通治統六經用藥 國朝程氏萬全膏亦有七八十味是 一合故其數廣而多前明趙府比

爲東加此加肺桂肝〇黛麥羗烏著 垣藥依附加枝加五此芽活藥术 擴 麻是總子紫良柴積在山防 ITU 黃目方內菀薑胡總方查已椰瀑 云人併五柱天岬蓬方外砂熱蘇山 参而减延冬加术人加仁加葉栀 其 胡桔黄昆参者此黄血治 薬之加菖梗苓布黄也就連加熱 湯只總滿白砂川連膏方連當 取一方獨蕊仁椒厚用內香歸 吳皂朴越加痰丹 景也綱 了三英角川鞠者加皮痰 內 香棱川心烏方也半桃食 川青椒加乾熬寒夏仁也附如 楝皮肉丹薑者加南紅氣治 與 子陳桂参茯卽吳星花加氣鞠 澤皮茵黄苓照萸瓜濕木川丸 仲泻川楝芩巴此火葽加香芎木 各半景全椒澤菖仁加加食白陳治方是半湯有蝎腎瀉蒲也味青加术皮血香油

至地者聖別二 苓之方膈四 極則變 逆極極 則湯而化用兼 化甲膽已至風 可 風散氣如分 病亦 數 庚陽症病木 其有地 類之更 於 相 陰假舌似 盖而 生 爲也 而層為 層寫 相 制 各安 而風劑平方 博 樂制之治似明

爲中中臟子盖盆兼則者和木 無心相 為補 宜陰香偏腎生 旺津者其用不黄膀也也 州虚必 能以如母白使連也又 F實芍偏乾 實氣者渴之用黃陰九相 用心子也挂細陽 皆必参火亦 母 辛之桂又知 於母補渴母 腹氣爬腎 配也 下陰氣諸用也也更火兼常五也若補桂故 五熟也者及母補連 肺滋補 有書相者 腎腎肺母云通必黄 言為也者

之焦水腸躁宜心之合又也术小土也脾症亦 類病膀火逼温用類如胃 是便不 有宜胱小大膽木盖肺為 或 不能金是 薄補病腸腸膽通臟合水 摠 通生不 其肾宜病大病以腑大穀 或 用金能 所是清宜場戰海相腸之 合 車而生之用 或 勝也肺潤病慄小表心海 前肺水 通 者〇腎胛宜賴腸裏合 木病而也歸治 移與肺平狂也也小三 或 通而勝又卿也 如三與肝宜〇如腸焦 移 又膀胱如 侮臟焦膀脾補逼治肝大 力 用脫病膀從心消 共腑通胱與心如肺合小 義 麥病而脱肝 所寒腎通小肝心用膽腸七總冬而治病以 熱病肺腸與與花脚膀情如黃治肺 房相宜病通大膽粉合胱總心萃即 和清病通心海腎總於五 司 焦胰泻病证腸膀也心之术也更正 胱小宜种治胱O 也主白治因治

助退清者活二其用也克泻補陰相 其 血法傷涼水土陰陽不二 不清備胃藥之也也再足火 足 平能血但心舉也者源金 豫 者者此如起初陽主 防絶之 血滋寒痰廣 廣 火源 血肾凉兼咯 略 無絶 以 補也水之熱爲火肝 防 陰心之 扶滯也宜疏以以 所則 患 再為不足者者本血 土川盖温風取 取 制木者如泻君足力 勝 矣無先治陽 抑带生甘治也水如又所保肝也肝之有傳 木而於緩虛O者治如制其病陰為 热心兼人又攻水用矣肺者有相餘 愈心補之如也者熱保之先餘火也 不安陰火治兼實藥肺類實而也治人也也也虛退動也者中發興者者實其陽及腎胃者之中 木也而退或風汗者防恐胛胛不陽病病 也〇熟熱火者爲守其火者治足有先治 培又不者太順三也洞燦恐心者餘清肝 餘

里輪消之 涼心の治風風金暑屬論金 膈神又濕濕逼氣火陰云也必 也治 統同凡 、而者統統味并三散云於類症皆能 一演自各部 爲足魄心血五風寒 陽精補食散燥斸風 五而溪風症其陽 症之取黄少藏統痛寒是復邪也暑 k連陽之補風溫也氣燥 者天寒血人故 之之方丹血醬散如燥類燥 兼火脉也補浆湯治

玉竹具 H

降降降宜降氣歸固肺丁曰云中白寒柏 將心病使治 降火心下及宜固 出之降熱可小兼其 下必则宜見便固腎如中 腎補の不共也の 肾叉禁氣如嫩陰 俱也从 日也升升鹿方成而 又則火革治淋氣 心降五喘而 因 自盖味用精於 通苓 欲不水等破晚上 柘湯門矣則升熱火藥故於者 濁之也失提紙 陰必腎其陽納 升不先寒升固氣宜其病又書方用黃

香文十以應椒如山藥。青旣解足續血瀉 本多毒 補達用茶 薑 甲 生 之黄葱輕 藥 具故為陰 通治攻 意所 香 實寫邪補荽蒜之 藥 而用 資者不青白強類亭猛更薬 而用方治六和 績 増 略言 規觀歷藥加品中劑中 通也亦酌馬桃膏遂附顺多襄四之方丸 大子耳 片百膏盆者兑榆甘哉川 麝病能寓盖及鳳遂先烏 裁川 热五剌川 攻雖諸仙草花 為補黃非 《少草蒼蘇木 没皆用秫補之菖君仁豆 無 類浦可单大 備旗寫 皆艾證庥黃 也 为人也力氣膏葉生仁黑 假 治吳三秦集所 1 李 縣者藉內花藥川丑 猛 證英陽克氣載

也告余痞 自 通中 **五知此之** 草創 阅斡 爲 歸 地 者多缺因其有 年風 氣 旣剋藥之 血流通 送用 極 數青不治也萬不能為醫 而病 圖 效人知 迥 lu 自已 特 自 知切其臟 能 而 外剋親 珍 别 重 效謝 開 成之 也皆與 規模始具究 是脚 門 缜 也令 爲所 可 而類克皆

等方及理中建中吳萸四逆附子真武白逼白散 得者有逢原之妙仲景翳之汕其方實爲立極之方 如麻黃桂枝靑龍白虎柴胡葛根黃苓黃連梔子漚 於古湯中求之一 心陷胸承氣猪苓五苓茵陳十 痛 九等方其藥峻属而分兩 **冀氏斟酌耳 學者欲製膏行道勿以余為法當期為其情廣情不學者欲製膏行道勿以余為法論數以五積通聖治之病無不愈余即本其法較襲生衛産等特泰用之耳昔襲氏謂人病不外陰寒** 一則取法乎上者斯得其中二則自 乑 之病無不愈余即本其此人所無不愈余即太病無不愈余即人病不見 人補等及婦人調經固經 人精等及婦人調經固經 叉大實能起人之死昔 聚自頭翁阿膠抵當 法外經肺張最 較陰安平五駒 襲寒胎盯膏黍

王子思三一年上 分兩不手事上上一下五錢也余謂合實竟照原相當古之三兩今之一兩五錢也余謂合實竟照原相當古之三兩今之一兩古之二兩今之六錢半 能用只宜降格以求多其藥味以倖有功或炭幾其 爲仲景之方高簡而其法更精嚴一 必折算再遵其法以爲加減真可以應變不窮或以 以他藥減其分兩實 **唐許氏云用仲景之法不用仲景之方盖亦以其藥** 取其分兩之大專而得力也令人用仲景方者多代 之峻厲也丹溪云用東垣之藥效仲景之處分盖亦 柯韻伯王晉三諸君所開發中材且未必解又何 則亦可於後賢諸方中擇之取官方之素效者 **H** ?非仲景本旨若合而爲膏正 絲不能亂喻嘉

即過竟混是加下法方涵之辟 使 峻笛 秘 另舉於同一味做者卽用類巽 藥 ○錠不不 用其臨假類理此以用其 方例時症不中推此何中此子必能 耳用用拘湯 寒 方有十十 多参 均用敷時用厚 歸 合温方香参者 無法熨甚單朴 寒 便有雖保 風 不聽法少用温附冲是涼有命 歸 可人亦可復中湯和各須海丹風。参 不自好分皆湯五湯人分風八風 之積香心一中賢湯 類散葛得温風即小散 地化此一但〇回湯秘一之春續芎 温推小寒此陽於方涼殊湯命芷 晉兩有一致雪余兩然危湯 四 如 歸方種與方急湯不種同氏祛蘇湯 風飲 有合假專場麻傳合是 **禹或膏冶陰柱方喜風粒至**耄 敗制此假不寒旦飲而用膏金寶活 蒙防不症能係湯薑傳何可丹丹愈 左

扎 金温理薑順清固角蒜香神虎·歸 露白中挂氣氣榮地紅調祐湯 散升丸丸丸丸消化散黄丸氣丸平 磁陽萬香之胡食痰三湯六散清胃散 陰散病稜類做化九和三君蘇燥散六暑 類坎降火光光 積 痰清湯黄子 火腸之茴 歸 北火芍四湯降之氣 滋豁藥物之氣類散桂丸 九五枳陰疾陽陽類陽 氣 苓青青雙 香實清湯止桃 血 鯞 歸 光導化竹劍仁 歸 氣 露中消散 平道飲和班防 各 葉湯 水 感滯光憑丹承 血 四昧九元九木飲痰榆對湯歸散散活清黛逼 藏 順大舟散攻香枳丸散子六補烏六 心心清金車八積櫃實木之東味血藥磨 丹如涼花九正九榔九香類垣地湯順場湯氣類 九天飮丸之散化丸滌和 痰 黄生氣六 味王地涼類落落加痰中 歸 湯津散鬱 骨膈 火 光味湯丸 痰 犀養木

膏膏真極 有 焦腸如胃之飲味湯肺温大洗之心 如散導如領子九雜湯經建肝類大根膀赤清 膽 兔鳴清盆中湯肝士 涼 本至 熱 殼狀散胃 胃 絲九燥元湯補如味 创九如分九 清清 小 九類肺 海肾湯 上方子飲胃 也百在 有 木丸大石 膀 肾如清肺脾類用 既腸膏 胱 九 如湯 補腎湯麻 之九萬廿焦 真儿看 攻顏三白露 各 如 有 湯飲 歸 北三蘇散 万短即散 测沉 其 神腎肺金脂 人种味 有 操香 上午 九氣湯降湯 参如陷 飲 湯温 解除金丸本 卷大胸 實而之人補妹 有 湯温贈贈金九杏火輔六薈簽胃湯如鎖温子湯中君九 茸養大胸 脏允半加丹肾易滋 有湯小夏味地光補陰氣聖仙腎 層保太承

力丹炒滴油每 且老黃水筋乾 不則丹成半藥 通合有甲 以 皆如 經油加輕 他 屬一 味 他方 易 於 次 計 清 於 3 重 之及有粉品一不之 力厚之 大而凡經 而两秤一筋 約 婡 品加 道 用 用開延須 油 地 之材 各方 汉良 从 ---; ---丽 各 具 挥曹 包 乃 合 貫之理 **半油** 可 老 小 木椒鳳約 斯為 开不 過 香萸仙薑島艾菖葱 聞 力 一再 餘蘇屬山柳易

南星半夏治火泉初火光用一百砒石膏豆豉又哮喘奪命! 藥合而為膏更通行也治肺 外分餘勿使見風每背可各自為用兩三膏亦可併浸水中出火毒風每背可各自為用兩三膏亦可併以一滴試之不爆方下。須攬千餘福令勻愈多愈好明,數化乘熱和入門皆粘勿炒珠炒珠無力也先 意為變格故多至百餘味實不如此之分晰精當 知之也或更以藥肆中尤散 有變化也此亦經十餘年體驗由博將返於約而始 方亦本於仲景沿其流者自能討其源也余膏係有 奧於膏為正宗用之旣熟卽可用仲景之方盖諸 而用儘足應酬矣此雖爲中材說法然是製膏之權 續增略言 充 加

川蟾九消萬治香京用皮香丸 丽 後 可酥抱脹病積滚師砒胡磠用 身 等九俱治槓九磠碡乾九 m. 加 中 賢峻腫消涎青雖大磠石 則 丹藥有塊丹人素黃砂 部 金亦舟九小 始 於 約 以丹改先急丹忌驗肉 取 觏 藥備活用蘇九青可人 心 此事推相 均掺命至芋抱州通多 膏 敷金如九 獲白 霏 刑 此摩丹蘇黑九九矣服加乾之 症症 雲 出 重 爲 多 草 膏 故 妈如而 搗 牛散光麝冶爲肉芷飲 用 貼 用 見前 活黃治萬 推藥 絡清脹應九有則數 骨 及 豽 略 過 

即**尚**黄枝 此白灵揚 龙虎葛 加 加藥法 實用法類 用 不敢傳 台作 有不 終敷 大腹前方 湯根柱 加湯加 可加者 肝 曲 而教人亦於醫書中尋究 暖 而 当門(日子)文白」 **达用**做一 **硝**白其句 若雷 参加葛精 四半根理 表参加 裏四半 雅 全在 **芍體** 惡 東 能 廣惟 胃 師 臨症 猆 掃用 垣 话變不能 用加 草官 例 意 ith 海海 有當加者有不 蔻柱頂頭食心備生半加 於 褲 仁惡痛痛加痛矣 九也仲景諸大 刻舟求劒故 等青各有 膏 觴欲 餘 痛加稿川須死 百絕 或黄本芎煎速 寒柏肢爲蘆覔 必 加 腹節君樸延 用中痛賴之胡

黃硝石子牡泄喘虛白用有下用宿當柴 **補牡黃池葛熱英榆蠣可用汗木白火熱半** 皮骨閉膠黃藥 重燥大 茂車 彩地 弱可可黄 東 前澤濕 垣 亭 MI III 黄陽棗梔官参怯濕厯 羊磁桑通 可劑 蒂二垣粉赤滯根方甘 加潤小木 寒可豆通可 去枯可 註熱紫去 **承景黃英冬去橘瓜內寫水勝黃** 黄血

也氣麻达白葵脫皮黃傷用多胱連痎連用

栀吳黃芽苓香脾萸枝犀芪草內甘用貝 丁温酸涼角山龍桂草木母遠蒼用 苔 補與胃藥茶香用棗用桑茱膽牛梢通前 用涼温窩補附香仁黃皮萸草夏瀉通胡 用用用于阴五連草酸決內用草骨冬蒲本成 涼砂味黃龍東明卷葱黃 二子举膽仁柴陳白 黄乾阁竹〇五胡皮蘇花小 英連蓋用茹瞻加羚植子粉腸神角 官青柴温皮羊椰嶺滑温金 石草實术子桂皮胡用寫角單隨石用銀 龙赤茯石木柴草橘用秿發子車 二芍苓膏香树龍皮青用涼大前戟妙連 白肉黄膽生皮木用黄 福薑芍瓜鼈〇 妈皮喜皮皮芍蔻連 七木用尘樂 阿甲斯 花朴查夏麻盆通當夏柴膠黄温牡樂粉益神乾連智芍歸川胡川連用蠣盆 二葉山芎前芎黃木石 EO茶桂胡黃芩香斛

門斷生邪渴地巴腎硝補 〇破子附車已勝袂鹿用沉續粟吳殼沙冬按放却子前黃胱苓茸知香暄殼茱夢参片 原命紙母肉子柏温號龍母苑子五黄歷山 也門蒐柴桂瞿知用珀板黄絲桃倍 凉( 破麥丹山木五柏 脑子滑放花滑香通味丹附麻牡黃腸 下海石紙硝石烏〇 子皮子仁蟖苓温 舊用古茴滑甘藥腎內地內枳豆槐用寫補椒温 十名烏硝香石草內有花骨桂殼蔻花人用用涼用四內藥補沉澤稍桂補蓉皮碳娟木化参麻人用陳 寫補沉無牛元故榔香粉官黃参知皮 在設內烏猪用香瀉膝参紙牽訶梔柱紫 盆吳苓杜生柏 乾蘇 **蓉乾木智茱瀉仲地子子內連薑防阿母生** 薑過菖萸乃溶補仁葱腐翹半風 寸子茂涼〇蒲涼潟用用烏白用石夏桑五葉 三大肉用命續用其澤熟藥〇世膏木皮味

仁血又寇批氣症須也經白羗此海〇智山採貼涼 紅熱治仁杷虛皆看足厥芷活已引按花宜血砂葉宜有醫足陰升足用經藥 蘇生亦仁重補用書經經麻黃之報例草柏 藥如也手足柏不使 、其此柴石 說之葉 香术法病藥胡膏太只藥香 陰在較侶柏補涼焦 血阿血破沉草令某引足 主與皮陰手善更易 痛熱熟枳逆宜血之薬○經枯用詳方猪参母 宜地實宜降以之例手手梗耳然所苓黃草 望見類泰手獨足。 乳梔杷厚香蘇如不 醫 足芍 垣 知 母陽 經 **宜**鹿之附鳥四叉 大少經經 場手

質则星也同角乾花無麻散枝少桂黑歸桂五 吳火不得〇生何薑非葱川柴解陰枝荆失氣倍丹 萸硝傷防又薑以則酷不芎胡肌細寒芥血虛白参 水水胎風巴搗通守不汗能乾緩 則豆用結而利由舉葛散厰麻蒲能生 血假製不同則此不附梔陷薄防陰黃黃引 瘀火法麻黄不配走子無上荷風川陽炒氣不血血 病酒也斑連直法竹無政行涼荊芎明靈歸攝噪腎 毛用下也瀝花不而散芥此用脂元血 ○非薑吐散蒼紫分 連
指不滑
又
蓋不不
此
术
蘇
經
根
類
炮
参
子
麻 大汁熱宣性羗平者少 亦炒火炒同用黃何又大味活散也陽表炙木蓯芎 製族君則大則同以附黃之走細麻用 火藥不黃走白行子非別經辛黃柴之 薑咯毒用小术經走枳也走白峻胡藥血 濕芷散太 反便用蜜而實の 夏不亦則導不不又而生寒陰陽黑 從泡寫配入非守通蔴散薑邪蒼風桑用幕 **K透南法心皂得芫黄升温佳**z

易与也不識症治單青尚C 載方亦有糁有敷只須所見者多識得症治加藥自 **病家嫌膏藥佝緩力請非處湯不可則不妨竟以** 用何逷足以取 頭煎服之方敗為煎抹炒熨於醫理無悖於外治 門亦變而不失其正與醫家亦分途亦合轍且應 也 兩藥 之有黃木茲士 此中自 用 具本領 O若行道者適遇急症恐 在藏表寒冶余一参裏衂法亦 試 用帥文中 可甘寒犀出内忽者發角但傷 所

理 法 馴 业 續 岐 伯 墹 摩 藥或 略 酸 前 旬 餇

也

不要艾返木 子子如烈毒 有 **皮難冷藥** 牌湯 重 恋 者 熨法 术心陽硫 散 用後处 黄非 同附然话 支柱 當附 炮附置歸子煎所熨方頓布 陽黃 白麝桑用炒於 可過重令時 硫盐腈 散附又黄皮眼 内 散陰其つ再 寒 煎 方黄調澄鳥用毒性按 病 陰 煮溪均丸又茄附附藥太陰加 毒 卽

田上命册計大人 直見 面目 区上三 7 關格垂死的 勝汗柏又立皮余有水荥 用此一 寒 可分 至於陰毒陽毒病至於三 扼發 則凡陰寒陽熱諸症均可用此一 者不行也。 沿 便以文 便不词有陰 头便行而-是流水煎 社 ○ 按 < 一便不通危險已甚 小便亦行矣 用前名工作首次 陽熨法亦 更以 E 法 矣之內物 傷 經髮

胞海治氣症臍 蘇末髮相盪浸 也 亦 創脚 臍 可揉 發 眼 當鋪法也 明 關 三古 臍散 元抱方歸 婚治 對 鹏 人誠法中花法有寒食皆或 可煎結或 可胸也 病脏見者摩推藥熱痰煎 贩 用 可 〇抹結或湯 **文用法** 也 つ著胞食 停寫心數 推 兒爲中熱 治湯火血背結 可 水之 两 袁多法族 幣是 命痼熨 發 腹傷 痛 多之冷氣治治 恵 散 何 原症海對少腫水 可 獹 脐边 多臂 用 臍腹脹 背 熏 結 [fi] 導 氣補方用炒腹胸兩面 前 自 可 P 重 胸 足 治盆 為病膽虛多煎遂薑與 後背 心腿 消 盪  $\circ$ 

等渣背推或酶

円

血多下寒在紫

腫

王治国四二

并

t

医手门

į

矣終恐邪 誠照誤入 或也育附鑒 其 目所 有并 淀 方 不載單 はなりなりていたう こ液 其見 枯仲 藥今賤人 於經 陰液 易得 亦 得質人 承氣 **榻黃連浸** 失 么社 根 相 曲 頭 **≦ L** 宜軍方 成 味而 坐視 **美症如** 始賢熱感 鋼蜡味 難

廷 碍即於 膏或 视火循駭辛即大治俱則 此照不然涼是黃法病難藏症輕同救惟滋温下先頭療精條 先 加膏 症諸也此陰熱 不疑是症之猖 雅塔明 法之外更泰以婕 麻口陰邪更荷鼻 必難法勞劑派劑黃乾陽至爲峽 言症可苦人當可附煩兩春分濕 也皆以人無用愈子滿邪夏明加 而再炒熨或煎抹 為及異白柯細面同始人 、 臨症 良少議虎韻辛渴發發多 醫年若加伯汗之與者宗 庭 用膏者或 法縛法坐 添多用人亦之例傷在乙類初 一有麻参云繼纖寒陽有是起 與炒製並 出之黃法桂以亳两分 神 路不附然枝附不 光煎 法 明存乎 外克人熱後黃喻陽療於 科聽参之大連嘉與在寒 湯其人時湯黃言少陰與 用 均 切 Mi 無隅 後 少陰與此挾 从因必用者基云陰分冬著風

罪不內徵從之聚故鼻法緩溪 **丙**應服而許又生口 自貧腑 不治亦其洗氏洗用受養能及 有須能冤推冤四有陽廻事 窮更乎錄出錄物形天 旭 业無 借業 尊所足載濃而 臓 腑外設親載見治煎兼清人芪沉 酬 批 無 可 善 塞 而 冶法之斷補跌湯平故之 豈大非藥壓令無鼻 政 准循當假能絕氣也受乎鼻大煎 智例求倘外者滿又有地側 者可其週治亦房按 爲幸萬此丹用口名 醫 之無全等溪四鼻賢受乎非若斛許 門失 Ĺ 〇總 無症之物吸方 弊必論湯受治形口 或欲固 此 煎以產地以通形 熏拘泻熏滋婦主養神湯愈黃 之定精俱益瀝過陰之藥丹 片 於法之不善法豈受咎哉醫之理甚高妙而出之以 口者 外 兼 虎不成不若刻鵠者也又所謂與爲牛後不若爲雞 慕高醫之一 反談人匪淺豈惟暗中折祿吾懼其辱也而或歸 及前人閥歷愈深膽愈小不得不遁而出此所謂畫 湯頭煎抹炒熨無不頭頭是道應手得心具有內 而讀書明理則 知古人處方用藥之意庻幾用膏薄貼用藥糁敷 一貫之妙否則依樣畫葫蘆病藥不相對或且相 **也自任如此故教人亦遂如此也惟是治分內 劑知二劑已也而自問聰明才力萬不** 一醫以此能通其理則辨症明白

理 題成當熱盖邪石助宜由 導多直而傷入膏胃薑表 温陽知 殺攻無寒內引 中葱而 醫 青頭 不轉骨 烽火 厥症思鍼中不厥丙傷經致散裏 灸風可陰太寒致燥之者 爲膏邓補病陰頭滬 在益有病痛 在之經盖頭頭身渴證用脲表經 發麻症 法絡邪痛不熱痢 而痛便 可人經無身是無亦利爾教格發不陽積勿用益府補執執症階進引 牌益府補 陰可輕苓陽寒傳 病用消梔叨初裏 o孔亦則 熱當大傷閉遵氣傷有熱導手察黃寒塞全流寒發藥了

自具慧眼者悉照此 是可不可之辨并在 此舉傷寒為例耳等 能内治者傅共法非禁內治之能者也太史公曰 之所不及非以內治爲不然也即此書亦爲中村 共見是良醫也吾願學者亦勉爲外治之良醫而已 行我之道不必問人之道吾駢文意在補前賢內治 至於醫之行道以謀生也人人 此样 類推幸 、相輕醫亦有然不可效也 沿着 、皆有謀生之心我 丰 忽須 及其取效 水 果 就 虚 實 宜 所以 一 等症傷

1. 好牛 宜於陰寒症若傷寒熱病頭面諸陽之 人已有變通之法推拿多係粗工機看採名水灸前 病俱不宜用盖無古人以自己精神消息也艾灸只 摩业令之燒 熨煎抹之法實足以代三法而看症用藥精切簡 地及陰虛有火者俱不宜用桑枝鍼癆瘵用大蒜 多且嫌炮烙入門云鍼但能寫實如虛損危病 善再能體會經文察其 動而伸之心隨而濟之 西えんすくか から 鍼灸 鍼灼艾推拿 **投摩法** 調力抹水 經文 外取 一殊不可恃余謂 陰 此然鍼灸禁 陽番其虚 會 ≑ 膈

理論事文一種地理言

藥經根太 擦 擦陽 部位 抹之中以藥 起於臍 治病何不可仿而行也學以治 邪 背两要拉 氣養其精氣之意疾徐 **叉募穴在前俞穴 今外科亦有熱湯淋** 傷 處治之可也 寒 力到爲候無不效者 脉横圆 乃推至尾骨磨所是 防經中央督脉經 延看症治是有六經 明明萬之 少陽 太陽 於腰均 在後督脉 膀胱用羗 洗神火 **輕重運手去** 照此推制 可 如其部: 照法不惜 有按摩生專為 擦背背 位當 於炒熨煎 脉行 用 柴胡炒 經 夫 腹 餘

**里龠所之下。賣會俗言** 削元氣雖目前或效而日後變生他病卒致不救其 煎濃湯採胸腹法藥等常而其效則甚速宜推用 极實由於此兩更徐文伯治范雲傷寒之發 犀地石膏則寒凉傷胃又食物停積不可用硝黃以 須平和繆仲純前臀治老人食冷不化有生薑紫蘇 不能勝藥如火虧用附桂吳萸則燥熱傷陰火旺用 頻洗安胎葱敷至妙難産用蟹法死者最條余催 多發漏用延胡當歸並椒等炒熨冷用蛇床子煎湯 婦人積冷痛經與子宮冷者皆艱生育忌熱藥種子 走 理外治亦 **氣血两衰** 

手、消息にご言 純陽之體不受暖藥且臟腑未堅并不受諸藥甘 **橙吳萸煎汁如上法淋洗遂產可以爲法產後症** 血冷凝滯用紅花煎濃湯棉蘸膏之并以器盛湯又 膏甚效 龜殼散代之 叉濟陰綱目載 **娛樂反生族是也文中兒初生有雞蛋清擦法風寒**風藥反生風川化文中兒初生有雞蛋清擦法風寒 煖又淋丛而生 益辛熱是變有麻油擦法恣荽薰法椒枝浴法酒雜敗毒是常稱 敷法宜推用口數法不獨行醫凡居家均宜 有跡表等法急斃有蜂蜜擦法痘症王晉三云痘症 1 Ħ 一男子又一 婦難產下體已冷用 婦嚴冬難產 111 小 椒

理を用が出く一つ。当月から父母に 醫用心腎湯等不效余以膏貼之似方加減而陰氣 歸舍者醫用黃連雞子湯及補心丹等不效余以膏 胎思經所謂適其所是也為適其所嘗有心病神不 復即與誠以服藥須從胃入再由胃分布散而不聚 **光方而火升叉有少陰氣厥舌瘖者醫用河間地黃 臌腑均妙者盖見病則治不走迂 飲子方而痰塞余治二症即以二方膏貼** 不若膏藥之扼要也又有腎消者醫用趙獻可! 叉與璘書論臟病腑病治法 心方加減而外越之神自飲又有心病不寒者 **运中病即止亦無** E 膏薬治

王将馬三 胸能開以 效 偪之則在 | 也經 從此悟出若腑病經日 一能引火亦可銷 椒尚涼用瓜蔗梨藕補 茶水糕粥之類古皆療疾特有忌者須慎耳 服藥須由 利地 善用者〇 此 者自移於下如陷胸 病 肺老鴨烏雞羊肝牛乳以及鹽 加以炒與煎抹盤旋摩邊尤能催之 止而不移其病不離其處膏之貼法 H <u>.</u> 風 焦而蓬 飲食治法如發散用薑憑韭蒜 法内 一下行流居處無常用膏 用业此非余之師心自 用蓮灰柿栗棗杏便浸 **承對可分用** 若膏藥之 油糖蜜

里龠許文人責會各言 **黃羗活蒼朮柴胡蘇梗荆芥防風牛子忍冬柳枝悉** 足礬石能却水此牆以收之之法也 待推用 白煎浴取汗此開鬼門之法也 潤以下之之法也 所以治表取腦中資水是治裏之法也 此以升為降之法也 者是用切薬之法也 石丸導法用杏仁從大腸升氣於肺而肺氣乃下行 又與璘書論先賢外治用藥均有意在略舉數方以 如治頭風鹽摩疾上所以清邪加白附子 **治腎水挾脚氣凌心礬石揚浸** 熱結便閉膽汁蜜煎導法是 治頭痛瓜蒂暗鼻暗鼻取嚏 消河餅鋪臍藥餅 治水腫用麻 治白帶礬

法也 地 生瓜葽汁和大麥麵為餅炙熱熨心頭此治本之 此 惡寒者服湯後即用炙法此見微知著內外夾攻之 卒死慈白搗納鼻孔及肛門氣通即愈此通陽之 陽生陰長之法也 址 有聲則風寒散突寒從足心人此亦治本之法也 妙處則法為之也茲不具載能者自可引伸 潔淨府之法也 陰寒多屬腎經附子燒酒浸透貼足心俟腹 **大病虛脫本是陰虛用艾炙丹田者此補陽** 大凡外治用藥皆本內治之理而其中有 中 少陰病得之一 風口眼喎那 乃經絡之病 日口中和背 法

致人於死藥亦能因 為良醫用藥不謬者言耳譬如治獄審斷旣明求其 諸君皆言醫有仁心死者其人之命固也然此只可 刑致斃亂用藥與是枉殺無辜也死者能無怨平我 生而不得我與死者兩無憾也若審斷不明或更濫 **亦豈能無罪乎醫之罪所以警門人也** 動之能無罪乎喻嘉言醫門法律歷言 病自問無他 可懼也余學醫二十年 所以 (與同人 有自己誤薬者有為他醫誤藥者報復之 个演唱略言二 析外治之 衛雖亦有治愈之人而功不抵罪其終也 疑義并引經 明用藥與會之法 一撿方治

可必 處湯者誠 過據 入 脾酸 恰當其位能 藥而內 薬之 文之亦各有其所欲 **阿**之之 之之亦各有其所欲如心欲 何則五藏各有其所苦如昕 據藥之性言耳 有鑒於此 了引藥似 (性言耳) 、肝鹽人 用藥往往 J 何 用藥者斟酌乎藥之 可到矣而或上或下或左或 有不能 血苦走骨甘走肉酸走筋叉五味所走辛走氣鹽走 五味 丽 究竟藥之能 抵醫之 胃苦 の開題補之が、一般と解言に 得 肝苦急急 肉酸走筋 入心辛 到與否 可與不 來醫 全 在 看

位 参見內治心葛亦治者 過或不 能中其病疾能不犯 產者根不 及而 邓 止者而 **降誤傳** 陷在此條於用 可必 提毒 無故矣 甚於與 於腹 痢 則 · 莱之難也。 大黃石膏 而 增 答 分 過 兩之 過 則傷 難減 輕重 即能當 痘症 誤領 也 然不 牛徑<mark>誤</mark> 膝犯用

田上本田上

(語門をする」とすべる

担消馬ブー程増取言二 藥攻藥元氣受削遷延時日爲累甚深或更值天時 常多也周官倘有失三失四之文仲景亦有誤汗誤 先入之藥不能去能救與否不可必也幸而得解以 誤家多已 者夙樂誤 下之戒奈何今人乃以為無誤乎知其誤而救之其 而始 者是 即見分曉者有三日五日而不見分曉者必待性發 不病所謂誤治之症是也豈無不誤者然誤者 月宝人教定一見不喜說錯與醫家自以為他藥他藥性發疑是此藥之誤而莫能辨其性有所制而不及發無由辨其誤者又有症性有發制而不及發無由辨其誤者又有症性未發信其有效再三服之而大誤者有疑其。其與具不誤也有本不誤而性未發疑其 共誤 誤則病退誤則病進或病外增病

けにとうなりたこととは見るまでは言うこと **嘆也其有藉 脾胃而死**令 要難再生醫者病家均宜慎之〇醫之例 有偏絕烈 門面死令人信藥不思其與民門出來如此血症用多可以 夫服藥太多精氣內傷 家倘 有失手悔恨何及雖湯藥不能盡廢然 乖邪疾其虛復生 以津牌工工 己前人民 愈服涼藥者卒至敗前人屢以爲戒非無 19.4 於氣增 酮

刊消島之一将は

静脉洪本 性命 蔛 陰陽範之 得胗時 善所能診持令 能 旋 之而 濇配 亚 滅 求 氣 一者莫不於是經探索焉然欲爲內 腑 明其 調 五行月令之 而脉之可 劑 感之死可 生折 少之生 髙 P 推り 庵汪語 一四時 指 開連靈中色 非喻 E 地 郭 規指 規 原大贫 竭 總色微 於 按濁 以者 於 講水天 尺而 PJ: 悉 指 預 息 沿 親部為 門 則皆 話 見 宜為是聲符分質脈察 察

理渝學文《續增略言》 惜也外治非謂能見臟腑也然病之所在各有其位 聖經無人闡發徒坐視斯民之天枉而不能救為可 謹者又束手而不敢為此近儒與良醫不能合一 師心以自用毫釐之差時有干里之繆其性情之拘 各有其名各有其形位者陰陽之定也名者異同之 **能知其家之病當時說為神奇** 有禪師望人形色而却病所在 材所論皆精愚謂水鏡麻衣相 內色在外明晦枯潤較縣更顯 人也陳脩閩目此是實話醫所 無定焉能一 胗面即知為何病 中 M

實奇上承先聖下 設立法於無弊聰明才力任自為之造化在手似 時實爲挽 庖丁之解牛宜僚之弄丸技也無非道矣苟明乎天 皮膚隔而毛竅通不見臟腑恰直達臟腑也初時 五城六腑是也按其位循其名核其形就病以治病脹見症皆分别按其位循其名核其形就病以治病 不能掩也此即臟腑之告我者也外也皆內也嗷壓 見有汞真皮膚之小試可於臟腑無傷精熟之後 判也形者凶吉之兆也位不能移也名不能假也 **人性命之旨能不有無窮之妙用也乎消毒飲在當人性命之旨能不有無窮之妙用也乎如東垣普濟** 迎余開此一門專爲吾黨中有心此事 拯斯民有重賴焉此固不必爲

理一個財文學有質的文字 少謀生即文人**确**。 外治一法有功無 大史公福鹃傳故 大史公福鹃傳故 者乎而熱者以凉冷者以暖隨四時而更變因是得 **箑冬之裘不在外者乎暑則卧簞寒則圍爐不在外 摖面非徒爲光澤也和血氣而升陽益胃也** 免於病不獨此也諮腸聚於頭十一 飲食屬內耳其餘有益於身者無非身外物也夏之 **五絡其血氣皆上於面而走空竅面屬陽明胃晨起** 以欺世者不知其道即近在人耳目前也人生惟 明心が真著が、紫過不獨寒士 發陰陽造 此〇有譏外治為證 後 | 經脉三百六 無此也〇八不能神也也之理性外 が出まれます。

濯 歌心 如注令 也 嗽 湯煩 此法一 安 此 所以温 热炒 故 福印臨 撥 堅骨 於又 爪能 用無 面胃 死 尿及 汗心止 可 能 称 足 飯後摩腹町山が一番 焼灰 却 髿 一陰皆此於 寒 睡睡 票用 踈 足 傷 **脾**運免積 風 所化 散 指 尿被能 腑 形 者也治 甚號 寒 者 睡 叉 也 槅 風 印 從 抹毒獨 | 痛則手 同無 也氣汗 足 譋 解 取 心 諸 即 攝 聪 居仙求以執餘 障

1

H

里命的计文 一个高具的日文已言二一 妙法則治諸症莫不可起死回生豈非人心之所士 藥餌也叉諺曰瓜熟蒂落婦人胎產始終不服藥者 以其法推之而體察於人情物理於無法之中別生 **夫絕症可以外治法救未絕者更易救也倘醫家能** 服之方時賢亦未有言內服者如以外治爲不然胡 多至小兒斷乳種痘只傳外治是外治不聞古有內 中特習焉不察耳彰日看不見遮一層觀眼走不動 外治起死回生有功匪淺蓋服藥者至此技亦完全 根開拐無理之言中有妙理老人有疾亦不恃 一內服之方乎叉洗冤錄所載五絕救法大都 Cont. Commission

班金角 許文 人士買 除日子二二 是也絡脈滿門 中之則腠理開開則入於絡 識其下手之處 治者治皮毛次肌膚次筋 通 之法吾固可遵而行之 者 之也 傷寒初 半死半 經 日風寒與百病之始生也必先於皮毛 大腸背流 於皮 · 宇 芸 者 葋 皮 一前人 皆是肺 所從 毛 掉內 源次六章 合含 頭痛發熱無 省 不傳之法吾亦可變 **脉**經列缺穴橫行大 **肝脉掉舍心肌** 於其台也如皮 也皮毛者 手處毛 腑次 1 焦 肺之 一臟治 次第分 前賢 合也 大規

加

加

加 相 腑

往往大 病皆入肺而自背得之尤速然則用麻黄湯內服 间 用麻黄湯治皮毛也所以 毛 出して 一材香附擦背其意即如此此一 人咳肺旣絡大腸叉與大腸 、麻黄湯抹背或抹中焦兼抹背爲徑提而得 也又按肺脈起中焦絡大腸肺系屬背几 用導法從 、腸受之若照東垣臟腑咳之藥例煎抹中 ţ **唿門入大腸升氣於肺表裏可兼治** 者不**攀石**九導法即如此此亦 Ħ 風寒也又太陽爲六經之首 **5發散肺經火鬱使之達** 為表裏肺咳不已 法也風寒入 肺

租房并 此又 故 敷小腹太陽以膀胱爲裹膀胱 後背叉屬少陰仲景少陰表症有 μ 法 育 解太陽之表也背寫心 皮膚傷寒·初起邪· 照麻黄湯例煎抹也此叉 背惡 也心營肺衛其治背一也 强然則以羗活湯內服亦不若 两 二可酌威用二兩黨参二 法也若熱在 一直宇石油二 寒者 當炙之附子湯 用 則治裹症 膀胱 在太 肺膀胱經所屬 陽 口渴尽赤者即 太陽與少 | 脱位 法也 在小腹之 ·麻黄附子細心湯 以羗活湯擦背 陰同行 炮二 丙也此又 邪中於背 兩芍 用五苓散 /陰病 活湯 藥 枚

这所再之一角 背爲胸之腑也未至於背則治胸旣至於背倘必合 背極妙 治背如菜病 之病皆 附 **合背冷伏飲合背掮乃飲之山胸膈** 太陽少陰交 子湯擦背亦能使陰氣流行 胸 膈始得趋胃趋腸而順下喻嘉急不費手治 可兼治背言背而心腹不必言也他如留 一俞皆在背其宍並可入 圳 一病者亦同此法 不必拘是前與後募的亦相 瘧疾是少陽病肠爲少陽之 垟 断三二 用柴胡湯煎抹腦與背亦 也五臟之 加 ,邪故臟腑病皆 爲陽此 而深蔵於背者 系减在於背 極背背爲 應故心腹 又 法 飮 也

有神解一 自古治病莫重於傷寒亦莫難於傷寒治傷寒者必 柴胡湯 統三陽三陰五臟六腑之所受病程立統臟腑言可 舰 所過 風熱病與雜病莫不 寒熱虛實行汗吐下 型以之 之經以調之而又融會平先賢內治處方用,刺法皆故其而又融會平先賢內治處方用 内 法即干萬法之所生也是在善悟者 / 1120年 | 1111 非利用的 服 此又法之 外治皮毛肌膚筋脉五臟六腑隨處皆 胸症與停飲同並可仿用熟於內經 寒言也其中 可推者 可知仲景傷寒雜症合爲 温補諸法能治傷寒則 也傷寒往 經

刊 桃枝煎湯液 柱也 抵柯 也四皆從 當下也景 摩托 本而承加 ○摩 汗而發之 馬 之言 而其原 謂 氣 人和 h 柯肌 實出 景 炬 **|** 家 W 业 者 云 和柴胡寒劑 大声龍於 於經經交內者內治 Ħ 利氣也調 散而 景在傷汗 用皮形難 其 胃 潟 麻肯 黄 北南省島と入り江戸程房面場之江河利 · 而裏實者則並 (標焊) 其高 形以 枝法 外 湯其在 者 為汗 川兼 者 温 按而 乔治 兼潟之 刑皆 加 汪 收 布註於

担合糸に 第一方世界温泉 推 其外治之方也 易之法也不言和 也如 可泄而 可外治經有張鼻泄之蒸浴按摩之 非外者不能內治外立於內 一治しんまくてきすって 一腸 陰病背惡寒者炙之附子湯症禁汗下者仲景以柴胡湯 根膽蜜導之法也 內者內治外者外治非有諸 是外治固可行也唐宋 掣引之 解温 不可性 補 少引除是也 以陽陰氣虛 心 柯云仲 學仲景者未嘗不 則 宜從 可汗 景方陽氣虛 主之柯云 **不能外**迨 內者不可 治者要可 賞 丽 虚 加 則

五清馬子 新井明三二

腫秘 脹者 病 汗之也知酓敷揉 也 方 所 清 選解肌! 是 傅 不拘氣 宜運 和温 揃 病之 備 通 裹 Ţ P 卢 矣 藥加麻黃羗活 胸 知 滿腹 **熏蒸渫** 著 便 或 J 力仲号 等貧 香 미 温 碟 是胸藥也紫不 通 煎浴 痰 內飲 或墊 便便如 凡 狗可 等頭 用

三方年に三 足提妙 懥 ilij 補二法於其中何症之不可治哉在臨症時消息 再布紮力大而可久鄉與罨臍同碗覆之 出 也 欲氣又有脫煎 吐者有欲停服 已 也の按別在皮毛即經言氣出於腦 影話と | 余治病以 利海拔 者取絞<u>止</u>食 仿嚏腸而窒 於心在 因其 膏為主膏之外有處坐熨抹 出於 亂轉 外治有此 則嚏 身而 亦從經文 也 育或 云經 爲故塵 也 為故塵日 《轉胞小便》 三法而更泰以 推出历 ス高者因 不通 卽 而越 和解 縛五法 當 燥 鼻。受

耳論思え 之 **入腥温藥** 本物取高 叉察陰陽 分通此也廪胃出 經網 和排明言二 湚 宫菜是透心 亦名嚏不位 南朝 之 日熨日浴日妆也。 0 玟 闸 邪 叔之 其重 訓 和 か為 番取びり 之 此 丰 基
重 婦 坐即 表汗 煎抹與縛 北 顶 减 皆心病位 也 池 開之 經云風寒客於上 湯 也可又 重蜀 染 墊 有 病 即經之炙巾 可 一般之 受 可熨可 地 而 潜症肺 氣下有 臊為熏 者引而 發腠 甘 地 否 p ○納

論馬文學物學言 處 肥 之 取則無往而不應也〇所謂分三部者何也人 以 也用者惟當分三部約六經察五轡六費升降清 胃居 和陰陽并恭古鍼炙法以知上下左右前後之 内實者寫 中下三部而皆以 綱實外治之活法也無乎不包 **取營衛分爲三**健 一路宗氣積於上 中焦注營行下營氣出於中焦 於時間 彰之 氣為貫 無心肺居之 豚 膀胱 亦無平文 虚兩法

脘 也心其傷息內膚 成胃 寒 较存者 海室 夜衛司 通 水 氣 成 天氣 經風於營 训 病則 通 地 世 納 宷 營陰 主 III 腐 凿 編則 后侧 熟 泻 出 Ē 臍 中 水 榖 焦 如竅 在 濧 便 鼠如 氯**赛** 時營 或於皮質 氲

**温無所司矣、 温無所司矣、** 虚勞 法海腎者也陰前利水後利法海腎者也腎主下焦膀胱 氣 **卜焦之凟通地氣而流行衛** 心傷宜建其中氣救其牌胃爲後天之下奉養莫貴 **邪**蓮 去滿 又人之 開 則又 布宗氣以行呼 《續增略言一 建其中氣效 湿 通天 開 炒熨煎抹與縛之法理脾胃者也可 氣地 縱 氣 焦不 則 氣以司開 穀爲布 而蒸腾營氣以 坐腑 散 開竅 通 根本計思謂 所以 於心肺 中下為三 上焦之军 不計思謂的非 闔 海於力 之二不 宗 **丁馬** 原 傷 深 亦 通 嚏 所以 部 泄氣 坐

證有 治升 裹與半 山縣 有 一員註 治 者亦 訶 瓤 再表 部 嚏 合高 煎 又頭至胸 再 中 者 東經 或治 與 卽 重適其至所此 間 而且遠近輕重以爲治 謂爛解 可 法 爲上 雜此見 有高 治 按 治 |焦胸至臍 表坐法 瘟疫 中 裏 扩 卽 之 治 證 可 病有 症治 乃温 酮 蝦 也數法 蟆 統 遠 適 治 卽 ニッチ 煎抹之兼糁敷等法者**即於此敷法中**拓之〇所謂 約六經者何也 明走從中少 大敦走期間間上東京 卆 胃從 三十七十 ストニー・・ 行身之前少陰厥陰行身之 是從是走腹也一人 推走原作 手三陽從手走頭走迎香小場一三陰從蔵走手前從中府走少 用其嚏之 日間十 圆街足三 属也 **原**從足三陰從足走腹 一經脈 兼塞尘之 二陽從頭走足簇睛 各有 颠 **心兼導妙** 起 少陰行 ·處

丑 0柯 是實兩太症熱中豚禁小。少 得 絡 可 后胃非 少 滿 陰 口 縮 陰 舌 乾 耳無 脉 加 邪脉於邪 陰姑 邪於雖 痛 病 肝 三裏 受為舌陰太利

埋 仲 爲節熱之與也 焦明浮柱初胃無也者陽 胃 景 関疾惡會强 胃梔解而發起實汗不以明 脚え 傷 以無風項痛 風言內 有寒而外便病處陽 明 是陽 ~ 續增略言 — 黃而出寫太陽 提 皆不為中 明 之裏苦 外不 孰 綱 太陽 咽自束及合欲主州病 治 胃 開者桂陽 之麻枝之 燥內做目 食不而 表 腹達惡痛要亦夫太根 家 匍 自便陰故 黄 궘 外寒鼻 県 四月實 台非為以為何 自燥開為主云 乾等 症湯 頭 悉 下明栀汗多也寫汗屎陽一〇陽除陽發仲爲經 盗堅明經 出或。 陽 胃 明 鞭馬之與 只問總賜 酸不無陽 c 汗鞭 醫惡仟明陽表只 有 明 身陽氣 寒而之明開封凡桐當有 阁 疼症頭 間表爲裏下裏也更裏收在 可有關合利症。 實此納 表腰頭寫 热法為熱以二故也言不太更以陽之疾痛諸一上陽脈麻有以反合和陰虛裏氣裹骨發陽

個不太小也的象非咽 咽 用攻是明為漿則而 乾導之病以三不欲三 人陽便腹滿苦裏目 無是少不滿內乾能三 之說根津焦 目 賕 法有 陽陽利心中眩開者 亦液質則不不 明併是下賴者能臟重柯之病下痞心皆合腑在云 少 是爲邪死吐病 陽 命主之矣厥如 根胃出然陰傳 悶下焦鞭下相開精半少 爲 主病之失不悸火之氣表陽 樞 更 陰陰於成次欲喜上則之少少轉在當是也陰不太 氣煎下結賣飲嘔走見總陰陰輸表 太胸之食渴空合竅爲皆陽裏 陽心機是咳竅之與陰半氣間寒多承從食腹 下也中是而則天樞表。仲 為小氣陽即滿 開鞭小焦上爲不地歸裏 景 深便是明 下柴失焦病見之重少 慮利陽而此吐 於利胡轉無也恰氣在陽 腸 故所明下若食 提 仲致丁則胃 上不湯運開。合相半馬 滿 景然 少為通裏陽 綱 止主之 發 有胃の明人 櫃 陽水之機之陽樞非の þ 之漿。也機病之表,口歸、苦 禁實勝又水陰

里台所文 人灰肝陰而皆熱柯 厥 可汗不折 利亦有 陰 用之全胸。吐 主乘閥中火陰太 提 四自 <u>‡</u> ブ 胛下夹化爲 並利衷 綱 結和 吳之人 也真 者之熱令陰厥有利且耳中陰 者之 志具品日本子·二 陰 柯 氣 為樞 等裏太 來不概氣至 比比 陰也細閣腎肺止也旺陰以 温有 dje 日欲是失氣中寐病常不 故願裏 氣者 Ú) 少 ○閤旺上陰症 111 者脉剧散腹 島折則衝馬為 氣不脈故充 也来痛 厥 疼 得欲 日則梅反胃氣陰提 者 有之綱 寐寐樞開九開閉 创 是也塞餘陽太 厥 ○ 故便也陰 在陰爲是 真是 仲 不 操飲病 欲 納陰表 陰之可裹 氣點用然 食 冷乾吐 脍 食 提 卽 綱 吐 坑也厥褐症」 蜕 寒出皆非脉

病病症分而裏傷柯症無亦如升升 俟與鼻此 吐立表云亦陽自霧而 皆利然立仲有則止而後 五景從死矣欬 五權故諸渴降 立雜太暑獨提温正湯中以 陽發皆綱之治 主焦潤 指皆症存之如劑 明外而熱指也陰。**湿**滋不病 矣太亦症內 之按而陰降 陰惡惟症 少煩利 陰嘔 傷傷內太陰太 病 病静而利渴而 寒之陰提陽 定傷網提 鈴 綱 最皆而亦與寫 陽賣斯必腎 多爲六 腹邪寒 則而 雜雜經痛傷邪 經 生利焦

軽合併と言 **陰多指甲唇青**型中湯中少陰2 烏皆丸煎泄除 梅是塞湯陽用 諭 得其宜矣臍中 如運 兼表裏者也可以 寒熱少陽少陰當會此如樞之意樞利而問問 樞 謂 - 当民公司父母公司一一 如 可之以意 Ϊij 樞 方,仿用從 口多意吐引者! 轉運則寒氣散也爲炒熨煎抹者 按 轉運陰陽之氣也經 名 神闕 血治 炒髮煎抹與縛之法樞 有 便 5月支蛤鳥梅梅 5月 有用身相原血有用鳥梅原 兩 旁穴名天 而陽 卧腹惡 日四於寒 英子 也 在 中不厥分 法酷梅可厥苓 皆 治厥渴逆

尹 而傷舉亦以表瓜通脈贊中在 解在散宜吐疏傷達見也矣其 鼻有治即 六 欎 受由三 H 者 該其 者 之經牌義伏 倩 何 病 瞀 指 未在胃木結 與藏可 也裏症替促也 傷精酌 六者寒者 贊滞不亦 發 ○疏多風化 代瘫 喻其隔之皆疽 鹶 日蔵酸屬是亦佛月 肝但木蔵也鬱鬱 沸几 トフ 也氣氣 使喜應 協氣調肝 五. 帶血合也括夏普 血冲而經雙時 滯血 得暢胆 宜焦之宜通當結 木 凝和視交 症 妈病之 欎 在 有 達 均輕脇 期 肵 生由運 之之佛當在陽因謂揚肋 訓 傷 晋 因豚為風之之主 可則其終熱強達劑在達嵩外 事氣 治解熱其其泄僅在筋者

〇此自肺帶本為水息之或奪壅馞 强實不在水費其病濕不滯其 皆 用謂可土通腎之治傷爲熱 開之以可宜標上法在飲作於在應喻藥 「遺野路三二十一 當如鬼折帥以防在源與氣閉脹 門非水制泛肺金金分爲濕 火如金過潔獨治水溢反聲贊或燥熱 挣抑在治折剋則無解塞爲喻滯主 之腎在之在水鼢表其痢日 脾之脾道〇或藏可邪中肌汤升 利壯法胃閉喻利應酌熱宜 經 可火如傷宜云氣肺攻入伐四 養在利金 可 世以氣陽 調 可腸 水 水胨可分 爲其 洲主 治水以水折 類腎 過 在治化性 利在 膀在水善也折小皮也泄 調便毛金踈奪 折 胱命治流水 之 凡門在壅之制是聲聲利也投

ļ 中見文 替血寒疸卧 又 計 者鼓怠 凝 為積 近血の脹惰家 朥 毋 之 法達 遙疑丹塔 濕 飛癥 使 11 之發之泄之可 過 以解 運放 暴 灰 瘕 透辨之 元者**替風無小**痛氣 治相濕寒力便首**替** 無元 水 之贊 其族 生相制 資 解 煎 木 治 瘀形 血聚散 火 酵之 金 痰無亦獻贄也便動陰 **秋形是** 生然紅則寒身 鬱 前つ 法 食喘便 坐. 成無法 主疾有費息發節木滯屬黃起熟走 也 法 詳非

理渝駢文《續增略言》 極此 濕 温用熱藥凉用〇外治假熱症以熱藥浸冷用郁是者以寒治熱佐以熱藥以熱治寒佐以寒藥或寒藥此治若再明乎盛虛同異正治反治以熱治寒〇反 病之有〇所謂升降淸濁以 微者隨之遊之甚者制之從之以用藥其酶自 非清不升濁不降陰陽不和之 地地氣上 只而秦服在沧河 詳能 清火化痰消食和中健脾者亦同此 包人於過而百運平反惟 病用此成日 樂則勿拘六臂之病宜行氣活血燥中自有精微之蘊解費之道不出乎中自有精微之蘊解費之道不出乎 上歸於肺〇此地入胃游溢精氣上 成之 
龜所對之道不出來 於食也今人鮮悟此理 於食也今人鮮倍此理 和陰陽者何也凡 故清陽 一輪於脾脾 治積 聚亦 病 無 同

陷後下邪而贖 氣 **三五走** 不穀五 之上解則 調逆從旗脹 在 竅則津 皆水液 病っ 臟 已幽清氣常上 塞而 涸 清陽 嗱 清 道反 而乾物天膀 氣 出 腫褐人 通 則 在 K 旟 生肺」 四 一天清 麦二前陽四陰後 脹 行清 之濁濁氣 濕陰道反 與不 則 淸 爲諸局。 應降預調 生 · 繩其陰降 : 渝燥大則 濁陰歸 飱 俱大 進 在 便 所 清 理外陽 清 益其 乾也陽 婦 下 六腑 [3] 渦 濁化傳 則

理論等 上削 筞 全 心 内 升 清濁 盛之 逝 厥鼠於 煩心密 極陽 塞遊吐 易 相 八頭則為阿 堡陽 干命 陷氣 陰反 不能榮故 黙俺首靜伏 曾略言 医陽否隔点 厥逆 關漸不故 相 亂氣亂於胸中是 此 H 透道於 推 頭 放拒 上相 上下海與家庭上下海與東京 重蛇 亂 清 於肺則俯仰喘 宷 通陽盛 關 逆亂而為此陰陽清 逆 於氣 爲大悦 鼠於臂脛 (外)除寒伏() 沫 極 **病**濁 則 能 於丙

利也的清明 而耳 亦 推 結於下于 從 脹法 自愈者 上可 於下 阖 可以 而 而 劉 p 升涛氣從下而 糸 理 竅利 批炒熨煎抹與缚之 於 至有 嚔法 降 陽 Ż 陽営衛氣 <del>]]</del> 則 屯蜀陰 加上 河洞 而濁 降 九竅不通 可以升 上逝 ىز ك 而 (帯赤) 駁亦開也 無升 坐 法 清 不至有 上也 行 通 H 清升 卫. 也 P) 可 加用 熱由 如 並達 城 推納 止者 即過大 腸胃 法可以 爲 降濁濁降 升之 而陽 lin 不 一竅開 無降 亦 調陰腸 鲃 和 而陰 而 m 降濁 於 竅亦 廖肛而者 吐. 乃 便 陷 練 不

解寒 历此取炙法安於炙 之 法 不是之景也靜 肌則 禽 K 勝濟也藥用 病 也爲 取 不温會 VI 行 前 71 從 督與 间 知 治 陽 須利以也愈 胸 睺 後 引 主腦 俞 ៕ 病 下取 陰 風陰 有 從 意此陽證 寒蹻 病 前 鮗 使陽 取 外陽 症 彷 後 引 肠 則足 陰 虛 腹 邪維 瓶 在: 脛 爲温 陽 訓訓 所 下用。 足 背 中 泄 回和 右治 仲升 氣 取 旁 陷温 陽是 者 取 也也 左 何 以於謂其弱陰而 左左經陰又病下 肵 病 衝衝 也 循 讇 陰 炙 起八奇。俞 海於原經在 右 針行乃宜利愈 取

理 問魔 能治 取 垂 到脛足亦 前 也亦 强順指 腰 疝 女 取 圃 後 ग 子胎 取 旁 而 後 取 可 而 胸頭 取 下 前春 與 治 取 喉面引少病起聚內 亦 而 中 陰腹腹季 治 旁胛 胞 可 痛臍腰局 恢 取胃 之有 腰 治 取 熨 丽 隨 膽或 煎 在臍 左 取 與縛 取 下迨 右 中帶裹病 下取当 而 鍼 石 於 取 也

氣元再水穴指逆太通截或炙或之是尖氣不 海の炙穀膏の不陽處血炙」 ○人此利盲反止即○路項壯線卹法暴闊买合 霍羯症小穴胃豕是産少後或纏血の窮元若 〇男膾炙後林髮屈足不被用手寒手內 轉止刺又水左中法血塗除手小止傷菖足中於經 ○炙腫女中○匈項兩大指温風浦 入脫黃中炙右脘喘扎膏筋指左紙胡或者陰指抄 **股及疸脘水炙期嗽中本宛就孔畲桃蒼生及尖** 鹽下變神分石門不指此宛骨取願殼未陰男炎刺 填利黑闢穴井氣止已可中節右門填削症女 臍厥帝用在三海炙見悟三上右髮人光腹陰影 中逆 [] 鹽塘壯 〇天 駢膏 肚 炙 孔 之 冀 揷 痛症 見 尖 上又九架文藥即之取乾視耳炙厥次升 之脉黑脐一炙種穴口與啞左左即視炙小 **寸膻心肺頭鍼門取於愈皮之** 灰蓝炙作此中疼俞風炙穴右小此覆此外脉傷穴 大炙心圈穴穴灸穴蒜取也右指炙 椎大角護能三大〇片穴可取頭之處薬 中樞關住分里拇呃貼相以左上變炙氣紋下症風

火挂陽塞替時刺入各筋通之舌此難○ 也手也耳於疫炙脊三縮即清面氣產婦宫氣 可心可治內皆不炙次可此氣 11 則推少挂用可心角愈可上系而足血宫。 風之輕俞弓○推升則脫小崩在遺 虚叉用肺反急の瘀連炙指燈鬧精 俟心備俞張鷲小血於眉外火元白 行凡均屬霜痛法膈燒刺見自心心侧爆對濁 心出用而俞手少初然刺不至大面炙 背商生下其若陰敦〇心 熱握能點王已の 按接穴炙降眉刺穴穴疝俞 發眼瓜 腕三願疾心眉即再氣腎 發汗自挖 外 處慢門凡則心產發炙俞 开又法空 三萬〇外腦此 20大關 法能也填 點 喉清 次燈臍治與宍產於敦元 眼 塞 法服 少人風須 症火 甚主範爆炙知皆通血處及海 五背手 青經通腦量爆 夏唐多 時蛇用傷臟風足筋絡而下不之陰陰 **鹽疫蜕尘寒點邪心處相心通語○交交** 

喘呼清陽對主之清陽膏如飲發汗外加藥食飲 加樂,陽受風氣陰受濕氣濕爲陰那陽病者上攻下外陽受風氣陰受濕氣風爲陽邪陽病者上 塞下爲飧泄从爲腸澼金仙膏主 節起居不時者陰受之傷陰受之入五臟則順滿 用膏之法有五 水膏主之極則· 邪者陽受之熱陽受之人六腑則身熱不時卧 行至頭而可頭而 ·極則下行行水膏主之傷於濕者下。 足受之行 下于正己 陰病者下行極而上 隆氣 端故傷於風者上頭先受之淸陽膏丰 下行至促 上行濕上甚清陽膏主之又發熱惡 審陰陽縣多實寒多虚犯城風虛 不馬熱 凡飲食內傷 用金仙宵如欲 : 從足 爲

理瀹財文「〈複増略言一 **粉扶陽**写 者發於陰陰症散陰膏主之陽症之陰寒 寒者發於陽淸陽膏主之 扶陽膏主之陰虛生內熱制火則 內寒散陰膏主之陽虛生外寒陽岸之 諸熱之而寒者取之陽而寒不去皆氣 薬 又有陽虛外寒陰盛 又陽盛生外熱腠理閉 然陰虛內熱外 一諸寒之而熱者取之 為寒馬器 「滋陰骨主ク 金仙膏亦主 塞淸陽育主之陰盛 中外皆之人水 陰冰 之無 亦必畏寒  $\tilde{\mathbf{p}}$ 過 原 現 財 東 別 東 別 東 別 東 別 、熱惡寒 滋陰膏 有 水人寒

里和井と 寒暑燥濕風冬傷於寒春必病温春之病長收改以生冬傷於寒春必病温春之病水火文而病自己矣。一多四明五行 肺膏主之 断也 仙膏主之肠瘧病腸滋陰膏主之陰瘧散陰扶陽膏 6 腎水清陽滋陰膏主之春傷於風夏生飛泄 主之秋傷於濕冬必咳嗽熱嗽淸肺膏主之寒嗽温 金仙膏主之夏傷於暑在內秋必核瘧母皆也 木滋陰水生膏主之南方生熟熟生水 世冯 在臟爲肝春多風木之病淸陽風淸 一直はかっ大い言って 者若不正之氣則是疫矣東方生風風牛 自己矣O 察四時五行 

天一年四三一人前 職爲腎冬多寒水之病温肺企生 病最 病心 全 、 滋 陰 金 生 水 膏 主 之 北 方 生 寒 失 生 水 爲長夏多濕土 生金在臟爲肺秋多燥金之病清肺藏清胃土生 陽風能行水器金仙温健脾片膏主之西方生燥為長夏多常二之非則爲風濕冬則爲寒濕也 十陰 熱火之病清陽之 八火水 夕且濕熱重預点人陰濕上三氣人 育 主之中央生濕 **坩 川 言** 之病吐清 別清 核 心君清 後時 風濕冬則爲寒濕也 温胃土 在海外 清肺金 脾 散陰 金 凊 在

理論財文《演習略言一一 皆屬於腎鄉無性 但言盛氣實邪未及於虛強不 唐·易皆屬於心險則養火甚則痛清陽雲台行水膏 陽滋陰膏亦主之諸氣順營皆屬於肺清肺膏主之 暑濕皆能化火化熟也劉河間本之著爲原病式然 解掉並主之按病機十九條火居五熟活四以風寒 之叉悲怒氣逆上而不下則傷肝清肝膏主之金仙 **愿則傷心養心膏主之形寒飲冷則傷肺温肺膏** 金仙膏亦主之能解治濕腫滿片屬於牌題行 温腎育主之散陰肓亦主之諸痛癢 仙行水膏消腫脹亦主之諸寒收引 度病情憂愁思 記 記

陰 逝 所 形 見耳 肝病者 **则頭** 育主 有 動氣按之牛若痛其病 健 無 者 加肝 脉厰 火虧者扶陽膏主之紅 難經日外證善潔面靑善怒內證臍左 肵 脾育主之又强 品 指青 含 虚善恐 與 世 散陰節滋陰膏 一種工種工 腹腦 無是者非也素問 如人 力入 不聰 / 應 胸脇滿悶淋漓 怒實則 將捕シ 此五 房則 肝木 白旗 亦主之飲食勞倦 肝病者 傷腎水虧者 虒 則 E 便難 中裏虚 號 兩脇 轌 脫 肝 氣 無

ť

臂 支 凊 心治婆還者養心膏主之肺肝脾肾膏心護並 **聲膏亦主之〇心病者外證面亦口乾善笑內證臍** 下有動氣其病煩 衹 · 对而痛出脚少的病质循臂被肩胛 陽城庙 以其病 火 湖脇 **脾病者** 心病舌卷短额赤心熱者色赤而脉絡溢質者清 腹脹滿食不 痛 冷 外證而黃善噫善思善味內證當臍 金仙脇痛 陰 脉 脾 内 皆 心 起 交 小 循 心别 心心痛掌 消體重節痛怠惰嗜卧 脉胸肩 治養心治肝虚 滋陰 肚水治 下開絡小門 肠 中熱而畹又胸中痛 可則的 Ú 膺背肩甲間 腸三 腹大 五蔵並主さ 焦支者 脳 指引痛 痛 有動 與腰 腑 胸 兩

氣脈則氣 不人少不 收 之〇 又身 石 肺 脾病唇黄脾熱者 胚胛 金 重善肌1 肺病者外證面白善嚏悲愁不樂欲哭內 續氣爲連 一四支虚 於足 仙角進一散陰節痛 毛氣 氣 內 矮胖主肌肉 則腹滿腸鳴氣極云 泗 浙 色黄而 失肺 寒熱又喘咳逆氣肩背 腎無豚 陰 膝 健脾補火生土 虛 肺 肉儒動熱者行 及 門脇音善足 耳鏡 則少氣 中 舭 不能 行善 飱 肺絡 斯足 報 瘛 脚

證 亦主 面 恦 黑善恐數欠 岗枯陰虛 風固 肺 / 虚寒者健脾 散 重 中痛腎尿注 陰治足脛 滋陰汗治 **叉腎病勸與顏黑** 尼 巨骨矮 經兆 放重 內證所 温肺温腎主之〇腎病者 |而逆又腹大脛 胃病者腹 下有動氣其病逆 清心養心野心 **陽虚扶** 腹 咳喘逆氣主 工焦枯 兩責皆治 小腹痛清厥 寢而流 屬俭 腎熱者色 外

理論 健脾膏 又 類水 脉続肩牌 所膏皆治<u>地</u>主 小上衝胸 端那女 火相激 叉腹中 反脹 肠中热出黄如檗熱者清胃清肺寒者金仙癖健不能久立與胃同候以立大腸胃同屬陽明燥金不能久立與胃同候胃豚人膝臏下足跗故不能 肩 **學文○人類增略言一** 耳前熱若 飢 並主之 咽不通食飲不下熱者清胃寒者温胃金 脹者 狼世 小腸連睪 在大腸 0大腸病 則 則冒脘當心而痛上 热者清胃清肺寒者金仙癖 者腸中切痛 日重感於寒即 或人腸於 者 育買 小腹 煄 肝肝散肺 痛 若獨肩 腰 而鳴濯濯明 格心系氣 **香控** 於 泄當 仙

子二月十十二 大能 善太 恐 (L) 並 閉膀 水金仙 包脉治 則水歸 癃 化則下 刨 便 膻 欲 少 便 而 不 大腸 膏主 焦閉 は見るまる」とすっ 焦實 金仙 弱 胱 通溢 利利 塞 胂 區首 水消 則 散陰 便窘急 鹏液 道出馬 胃氣 即為脹 蔵 泄 小贝連 虚者 亦主之 則口 於肩 則 腫 化川入出 上熱 治學數 欧野 氣不 脉循

坦浦 其病之兼臟腑者皆有臟腑症始膀胱大腸移熱於胃之類詳的如腎移寒於脾脾移熱於肝 之痛經企仙膏加藥壓仙官付吳英丁香當歸主之 他症者清肝清胃清心滋陰健 血寒經閉通 肺心氣不得下降故月事不者屬心向絡於胞中今火上 婦女之病當調經期護胎産經日二陽之病發心脾 類膽中有 **有不得隱曲女子不月** 故也 即为二人程理明三二一 司 一經育主之但不調者通經與安胎賞 肝肝膽清胃胃 公五臟六腑 又月事不來者胞脈閉也脫 逆者膏主之虛者養心膏 逼 寒 清肺養心膏主之 見經文然後用藥 脾金仙行水膏並主 熱相移者宜究其本 則分臟腑而治之C

潰者雲台膏虎散主之半 石血铁各 産膏主之()乳 者散陰扶陽宵主之 五世 **育主之已破雲台膏**虎散主 会 胎餘府二. 酒 灰油兩龍殼皮 陰虚 錢未熬鳳骨麗川 脂芎大 炒白熟 各黃仙社 五丹乾蜡炒 如 膠錢收者延蕭芍地 乳二枯入入机黄白各 岩 病 陽毒紅腫熱痛者清陽膏主之欲 ) 胎不安者安胎膏主之 産後衛 兩礬木錢船炒朮 香艾炒僵甘兩 破 陰 之陰 土桂四五蜂羌鳥 半陽核塊等初起金仙 護岩膏 乳线袋房活 南 症不 子想仁鳥黃 紅. 王之子宫 黛 ) 附護岩 腫 熱 椒槐芨 附夏 捕 三枝飲白陳黃膏

理渝野大厂看增略言一 當然而不抉其所以然嘉言先生所訓無方之書全 後各膏中有以古湯頭方及單方熬膏者照此推 藥敷藥○此本經文以言用膏之大法耳其詳見於 治之學質有根抵道本自然非同穿鑿神而明之自 前略言已述大概惟於經旨未有闡發是但論其所 庶可由是而盡其精微焉時同治玉申夏四月也 見變化不測之妙聰明仁愛之士茍有志於深造者 貫之理乎今特詳引經文分别以證明之俾人知外 右三條乃余之所為外治也用藥與膏之法駢文及 不考究有方之書奉爲靈賢者也何由昭外與內通

麻黃敷法 中之那食發病者三出病 皮膚之間 發病多在上沙氣 水 治所以 泥 其 發病多在下人之六味辛苦鹽淡 可泄 以睫為之 消於經絡之內留而不走按風寒在 肯 可汗 而出之 物性儿 部者子 一也今 而發之 Ž 自 **善則為病地之** 以化生萬地之 寒濕固 刨 之痰食 者亦三 1 飲在 風寒之邪搏結 胸膈者皆 風寒暑濕 酸 氣霧露 **痺上** 症者

嚏 從上 從病主 效應 Э 手則衛又經屬風心 門竅 須者 再應也不 取 μ̈ 起是傷 肺 陽宜 吐之 而 出 也傷衛皆 出 寒傷营 汗心柯 陽陽中 此 止古 明 爲 伸 뮰 前台出 開 有 火 屡發屢 **医發展煙煙** 以床柱 心 营之爲伯法 胸 周 **高陽水云之身入**瘟 胸 為表 出 病心克太大之未发 發 則心 當 即可所 至 阨 之 H 仿 得 肺之大 百 用 酸 杰 汗 餘 病陰症陽子導 而 心肺非心和引 次樞 述 法 病心膀也說其 湧 諸 愈見 症 主脱寒罗 則 煩誉之先 悉 除肺肺胃傷 取而

行呼吸與又感象黃庭經日呼吸廬間入丹田鼻和火帶清道則香臭不知並宜嚏又宗氣出於鼻 腦後日玉枕關夾脊日轆轤關水火之際日尾間關 膻巾為氣海臍 氣之所終始也 屬肺下達於腎大陽日魄門可知嚏坐相通之理の 斟酌〇五氣入鼻滅於心肺心肺有病則鼻為之不 最稳或有宜嚏以升之严陷坐以降之者上断人 **氣出入升降之道路也外治以理氣為主** della 則舜塞不通並宜嚏又宗氣出於鼻以 三二焦通則周身之氣通矣背後三重 少陰兼水火 下亦為氣海臍中央名神閥三焦者 不測煎抹

金之聲也水土之替用坐者順其就下之勢而通 煎抹當於此着手○靜多在中焦木醬用嚏者木 條暢也火醬用嚏者火性炎上 **肾積水與轉同治行令中暑多在心胞絡經即火鬱** 之義六欎痰用嚏者痰宜吐也食亦用嚏者氣升 壅滯也五積應五藏肝積木心積 六有下咽 加鼻衂 直行氣血自生則中焦之正治也0內四人為大撫芎可證亦有下者炒熨煎抹調 門 外治則其途甚寬然須熟於內經經 一也金臂用嚏者嚏為 /肺積

寫之下焦桂枝去桂加苓术利之此即經開鬼門并 三法上焦小青龍五苓散汗之中焦大陌胸十棗湯 **喻鼻法治二便用熏洗法實仿其意又仲景治水** 奏效者以此〇內服以仲景方為祖外治亦然仲景 治濕在上腹中和者必能腹轉用瓜帶散納鼻治 虚熱用膽痹法皆不肯誅伐無過也後賢治頭塩 門法啜面法貼眉心法塞耳法熨胸中法敷背後五 不必拘銅人圓而隨處皆可按症用藥較內治爲易 推法途野霆法沒足法友中,所因不同治法亦變 火在心則札中指火在膀胱則敷頸後。如又有搭頭

理論學文《檀增略言三二 府法群立有陰陽水浸足法治關格有牙皂細辛加 黃羌活等前湯浴背汗法寶鑑有鋪臍藥餅下法治 巴霜塞鼻法,形治喉痺有炒鹽熨臍法有牙皂煎湯 去静陳莝 河餅利法亦從仲景三法川藥至治霍亂有皂角取 沿小腹法大蒜塞肛門法並同〇用藥之法亦非 **法有炒鹽熨胸背法治縊死者** 如重傷風嗅鵝不食草取嚏以散表脾寒虛瘧嗅 梅亦居坐是也與此例推〇癸酉 **,潔淨府利三法也外治病機沙象有麻**